

16. *M. lacteipennis*, sp. n. (рис. 9, 15, 39, 84, 85).

Маленький, черный, медно-блестящий, голый, с почти целиком белыми надкрыльями.

Голова целиком черная, блестящая, ширина ее с глазами у ♂ 0.9 мм, у ♀ 1 мм. Темя слегка выпуклое, в 2 раза шире глаза у ♂ и чуть больше чем вдвое у ♀, с несколькими черными торчащими щетинками. Глаза сидячие, красно-коричневые. Лоб выпуклый, наличник у ♂ выступающий. Усики черные, у обоих полов одинаковые, линейные. 1-й членник усиков черный, блестящий, с несколькими торчащими щетинками, которые длиннее диаметра членника, его длина у ♂ равна ширине темени, у ♀ наполовину ширины глаза больше ширины темени. 2-й членник у ♂ в 2.5 раза длиннее 1-го, черный, с короткими полууприподнятыми щетинками и волосками, у ♀ он вдвое длиннее 1-го. 3-й членник у ♂ в 2 раза, а у ♀ в 1.5 длиннее 1-го, черный, с редкими щетинками и белесыми волосками. 4-й членник у ♂ наполовину длиннее 1-го, а у ♀ чуть короче его. Хоботок черный, заходит за вершины задних тазиков.

Переднеспинка черная, медно-блестящая, умеренно выпуклая, голая, длина ее в 2 раза меньше ширины у заднего края, бока дугообразно выгнуты. Щиток черный, медно-блестящий, с редкими белесыми волосками, на $\frac{1}{3}$ короче переднеспинки, соединен с переднеспинкой плавно, вершина его черная. Надкрылья почти целиком белые, с узкой черной зоной у щитка, обрубленные на вершине, с широко закругленными внешними углами; общий шов их слегка короче щитка. Ноги черные, с более светлыми коленными суставами и наружной стороной голеней. На передних бедрах по наружному, а на средних и задних — по переднему краю имеются приподнятые, толстые щетинки. Такие же щетинки имеются на верхней стороне передних и средних и нижней стороне задних бедер. Передние бедра усажены щетинками и по внутреннему краю. Голени всех ног на наружном крае рядами толстых длинных, торчащих щетинок.

Брюшко черное, медно-блестящее, с параллельными боками, у ♂ не выпуклое, у ♀ умеренно выпуклое. Генитальная впадина ♂ овальной формы, параметры без зубцов по наружному краю.

Длина тела: ♂ 2.5—3 мм, ♀ 3—3.5 мм.

Близок *M. limbatus* Reut.; отличается от него медным блеском, отсутствием белых пятен на глазных орбитах и формой гениталий ♂.

Голотип — ♂ (ЗИН): Киргизия, долина р. Чаткал близ Янгибазара, VII 1968 (Быков). Паратипы (ЗИН): вместе с голотипом, 10 экз.; Казахстан, Каржантау, 27 VII 1938 (Обухова), 80 экз.; заповедник Аксу-Джабаглы, 10 VI 1966 (Кержнер), 1 ♂; там же, 17 VI 1966 (Фисечко), 13 экз.

Обычен в поясе предгорных степей и кустарников. Приурочен к слабо увлажненным стациям.

17. *M. acutifrons*, sp. n. (рис. 6, 17, 41, 42, 91, 92).

Маленький, черный, блестящий, с почти целиком белыми надкрыльями, сильно утолщенным 1-м членником усиков у ♂ и конусообразно выпуклым лбом.

Голова целиком черная, ширина ее с глазами у ♂ равна 0.9 мм, у ♀ — 1 мм. Темя ровное, у ♂ в 1.5, у ♀ в 2 раза шире глаза. Лоб у обоих полов конусообразно выпуклый, у ♂ со щетинками на вершине конуса. Наличник у ♂ выступающий, у ♀ невыступающий. Хоботок у обоих полов заходит за вершины задних тазиков. Усики у ♂ и ♀ неодинаковые. 1-й членник у ♂ сильно утолщен, к вершине черный, с многочисленными торчащими щетинками. У ♀ он слабо утолщен, почти линейный, со значительно меньшим количеством щетинок. Длина 1-го членника у ♂ меньше ширины темени с глазом, у ♀ чуть больше ширины темени. 2-й членник втрое длиннее 1-го, у обоих полов черный, усажен щетинками по всей длине и светлыми волосками в вершинных четвертках. 3-й членник у ♂ и ♀ вдвое короче 2-го, черный, с короткими щетинками и беловатыми волосками. 4-й членник равен по длине 1-му, покрыт светлыми волосками, темный.

Переднеспинка слабо выпуклая, черная, блестящая, голая, ширина ее у заднего края наполовину больше длины, передний ее край по ширине равен длине. Щиток в 2 раза короче переднеспинки, со светлой вершиной, почти ровный. Надкрылья почти целиком белые, лишь в области, граничащей со щитком, черно-бурые; вершины их обрубленные, закругленные по наружному углу; общий шов равной длины со щитком. Ноги темно-бурые, лишь передние и средние бедра у вершины беловато-желтые; передние бедра на нижней стороне, по внутреннему и наружному краю со щетинками, средние — по нижней стороне, переднему и заднему краю и задние — по переднему краю с редкими щетинками. Голени всех ног одноцветные, темно-бурые, с многочисленными толстыми щетинками.

Брюшко слабо выпуклое у ♂ и сильнее у ♀, незначительно расширяется к вершине, голое, черное, блестящее. Генитальная впадина у ♂ слегка вдавлена, яйцевидной формы.