

Antena inserida acima da porção inferior dos olhos, segmento I muito curto, igual em comprimento à metade da largura do vértice, mais grosso que os demais, segmento II ligeiramente engrossado para o ápice, cerca de 3 vezes mais longo que o primeiro, segmentos III e IV com aproximadamente o mesmo comprimento, os 3 últimos segmentos com pilosidade de comprimento maior que a largura dos mesmos.

Pronoto inclinado para a frente, mais estreitado anteriormente, calos obsoletos, margem posterior largamente arredondada, muito levemente sinuada na base do escutelo, margens laterais arredondadas, disco do pronoto pontuado, escutelo plano, pontuado, mesoescuto encoberto.

Hemiélitro fortemente pontuado, muito levemente mais largo na região posterior do cório, embólio bem delineado na base, confundindo-se com o cório na sua porção apical, veia braquial bem delineada estendendo-se sobre todo o cório, cuneo muito característico, praticamente fundido com a membrana, menos quitinizado que o cório e separado deste por uma fratura muito profunda.

Membrana com aréolas pequenas, ângulo interno da aréola maior arredondado, margens exteriores a partir do cuneo, arredondadas em semicírculo.

Pernas normais, região coxal anterior e fratura coxal bem desenvolvidas, peritrema ostiolar saliente com superfície rugosa imitando pequenas escamas de forma arredondada, arólio do tipo *Orthotylinae*.

Tipo do gênero: Adfalconia cunealis sp. n.

Este gênero é muito próximo de *Falconia* Distant, 1884 com o qual se confunde na chave genérica apresentada pelo autor senior em 1955 (*Keys to the Genera of Miridae of the World. Bol. Mus. Goeldi*, 11 (II): 69). Difere deste último gênero nos seguintes caracteres: segmento I da antena muito curto, de comprimento igual à metade da largura do vértice; cuneo extremamente reduzido, marginado externamente em quase toda sua extensão pela fratura cuneal; pronoto não estreitado ou sinuado no 1/3 anterior. Em *Falconia* Distant, o segmento I da antena é de comprimento igual ou superior à largura do vértice. De *Falconiodes* Reuter, 1905 difere por ter os olhos contíguos à margem anterior do pronoto e hemiélitros não arredondados lateralmente.

***Adfalconia cunealis* sp. n.**

(Figs. 1-5)

Caracterizada pela sua coloração e genitália do macho.

Macho: Comprimento 2,2 mm, largura 0,8 mm. *Cabeça*: Comprimento 0,1 mm, largura 0,6 mm, vértice 0,32 mm. *Antena*: Segmento I, comprimento 0,1 mm; II, 0,5 mm; III, 0,3 mm; IV, 0,2 mm. *Pronoto*: Comprimento 0,4 mm, largura da base 0,8 mm. *Rostro*: Comprimento 0,5 m.

Coloração: Preta brilhante; região lateral da cabeça e lados dos olhos superiormente, antena (exceto ápice do segmento II), pernas (exceto extremo ápice dos tarsos), rostro, claro-amarelados membrana infuscada com porção apical hialina.