

Caracteres morfológicos como descritos para o gênero.

*Genitalia*: Aedeagus (fig. 2) com vesica bilobada, cada lobo terminado em pontas esclerosadas, além de dois espículos distintos, como mostra o desenho anexo. Hárpago esquerdo (fig. 3) curvo, com cerdas dorsais e ápice em forma de gancho. Hárpago direito (fig. 4) com duas pontas e cerdas dorsais.

*Fêmea* desconhecida.

*Holótipo* macho, Suriname, Kabcil ig, V-1961, P. H. van Doesburg Jr. col., na Coleção do Autor.

LISTA DAS ESPÉCIES DE MIRIDAE (HEMIPTERA) COLIGIDOS EM PARAMARIBO, SURINAME, PELO DR. P. H. van DOESBURG JR.:

CYLAPINAE: *Fulvius bisbistillatus* (Stål); *Fulvius quadristillatus* (Stål); *Peritropis saldaeformis* (Uhler); e *Xenocylapus nervosus* Bergroth.

DERAEOCORINAE: *Teratophylidea opaca* Carvalho; *Hyaliodes glabratus* (Distant); e *Surinamella doesburgi* Carvalho & Rosas.

BRYOCORINAE: *Bothrophorella nigra* (Stål); *Cyrtocapsus intermedius* Carvalho; *Cyrtocapsus nannus* Carvalho; *Monalonion dissimulatum* Distant; *Monalonion annulipes* (Signoret); *Neofurius urucuianus* Carvalho; *Parafurius discifer* (Stål); *Pycnoderes quadrimaculatus* (Guèrin—Ménéville); e *Sysinas fulvicollis* (Fabricius).

PHYLINAE: *Cyrtopeltis varians* (Distant); *Macrolophus praeclarus* (Distant); *Rhinacloa subpallicornis* Knight; *Tytthus neotropicalis* (Carvalho); e *Tytthus parviceps* Reuter.

ORTHOTYLINAE: *Halticus bractatus* (Say); *Orthotylellus carmelitanus* (Carvalho); *Platyscytus surinamensis* Carvalho & Rosas; *Sericophanes dispersus* Carvalho; e *Sericophanes ornatus* (Berg).

MIRINAE: *Dagbetrus phaleratus* (Berg); *Dolichomiris linearis* Reuter; *Horcias atratus* Distant; *Horcias nobilellus* (Berg); *Neoborus cribratus* (Stål); *Notholopus filicornis* (Fabricius); *Paraxenetus guttulatus* Uhler; *Poeas reuteri* Distant; *Poeas umbratus* Bergroth; *Phytocoris mistus* Distant; *Polymerus testaceipes* (Stål); *Prepops cruciferus* (Berg); *Prepops circummaculatus* (Stål); *Taedia pachycera* Reuter; *Taylorilygus pallidulus* (Blanchard); e *Xenetus lanuginosus* (Distant).

SUMMARY

A list of species of Miridae (Hemiptera) collected at Paramaribo, Suriname, by Dr. P. H. van Doesburg Jr., is given. A new genus, *Urucuiana* g.n., and a new species, *tuberculata* sp. n., from the same area, are described and illustrated.