



Figs. 2, 7 e 12 — Cabeças de *Acegima albofasciata* Poppius, *A. brasiliiana* n. sp. e *A. guiana* n. sp., respectivamente vistas de lado.

FÊMEA: desconhecida.

*Distribuição geográfica*: Brasil (Mato Grosso).

*HOLÓTIPO*: macho, Jacareacanga, Pará, Brasil, XII-1968, M. Alvarenga leg., na coleção do autor. *PARÁTIPO*: macho, Jacareacanga, Pará, Brasil, VI-1970, F. R. Barbosa, mesmas indicações que o tipo.

Aproxima-se de *Acegima albofasciata* Poppius, 1921 diferenciando-se pela coloração da cabeça, ausência de tubérculo na fronte projetando-se sobre a base do clipeo, engrossamento da tibia posterior e morfologia da genitália do macho.

#### *Acegima guiana* n. sp.

(Fig. 12)

Caracterizada pela coloração da cabeça e da tibia posterior, presença de cerdas eréctas no segmento II da antena e tíbias posteriores cilíndricas.

FÊMEA: comprimento 3,6 mm, largura 1,5 mm. *Cabeça*: comprimento 0,4 mm, largura 0,8 mm, vértice 0,40 mm. *Antena*: segmento I, comprimento 0,4 mm; II, 1,1 mm; III, 0,7 mm; IV, 0,6 mm. *Pronoto*: comprimento 0,7 mm, largura na base 1,2 mm. *Cúneo*: comprimento 0,52 mm, largura na base 0,48 mm.

Coloração geral muito semelhante às duas espécies precedentes, exceto na cabeça que é pálida com estrias oblíquas mais escuras. As pernas são pálido-amareladas, tíbias posteriores avermelhadas (exceto na parte apical), coxas II e III e base do abdome, pálidas.

Antena com pubescência curta e algumas cerdas finas, eréctas, de comprimento pouco menor que a grossura do segmento; tíbias posteriores sem engrossamento mediano, espinhos curtos.

MACHO: desconhecido.

*Distribuição geográfica*: Suriname.

*HOLÓTIPO*: fêmea, Paramaribo, Suriname, 15.X.1961, na coleção do autor.

Aproxima-se de *Acegima albofasciata* Poppius, 1921 e *Acegima brasiliiana* n. sp. diferenciando-se pela coloração da cabeça, cor avermelhada da tibia posterior e pubescência dos segmentos antenais.

#### SUMMARY

The author presents a revision of the genus *Acegima* Poppius, 1921 with descriptions and illustrations of the following species: *A. albofasciata* Poppius, Bolivia; *A. brasiliiana* n. sp., Mato Grosso, Brazil and *A. guiana* n. sp., Suriname, (Herdoniini, Miridae, Hemiptera).