

mido; jugo, loro e gene reduzidos; o rostro atinge as coxas medianas.

Antena com segmento I mais grosso que os demais, revestido de cerdas erectas, segmentos II-IV engrossados para o ápice, com pêlos muito curtos, entremeados de pruinosidade (forma arredondada da extremidade dos pêlos), quando vistos sob luz incidente, segmentos III e IV fusiformes.

Pronoto trapeziforme, shagriné, margens laterais levemente reintrantes, margem posterior levemente arredondada, calos obsoletos, colar estreito, deprimido; mesoescuto quase totalmente coberto; escutelo plano, rugoso, com ligeira excavação basal.

Hemiélitro pontuado, sobretudo na parte apical, revestido de três tipos de pêlos: cerdas longas, erectas, pêlos achatados, lanosos, adpressos e pêlos semi-recumbentes; embólio explanado, cúneo aproximadamente tão longo quanto largo na base; membrana longa, biareolada, revestida por diminuta pubescência.




Fig. 1: *Ceratocapsisca cuiabana* n. sp., macho, holótipo.

Lado inferior com peritrema ostiolar muito grande, tendo sua margem posterior sob forma de platibanda; pernas curtas, espinhos das tíbias fortes, de comprimento aproximadamente igual ou pouco mais longo que a grossura do segmento; abdome com cerdas erectas.

Espécie-tipo do gênero: *Ceratocapsisca cuiabana* n.sp.

Diferencia-se de *Queretarius* Carvalho & Schaffner, 1974 (fig. 42) por não possuir cerdas erectas nos segmentos II-IV da antena, por ter a cabeça mais afilada e sobretudo por possuir o peritrema ostiolar muito menos desenvolvido. Difere de *Ceratocapsus* Reuter, 1876, do qual se aproxima, pelo pronoto shagriné, pela presença de cerdas longas e erectas em todo o corpo, especialmente, no segmento I da antena, pelo grande tamanho dos olhos e pubescência do hemiélitro.

#### *Ceratocapsisca cuiabana* n. sp.

(Figs. 1-7, 32-34)

Caracterizada pela coloração negra do corpo, pelas tíbias I e II com extremidade apical pálida e pela morfologia dos parâmeros.

**Macho:** comprimento 3,8 mm, largura 1,2 mm. **Cabeça:** comprimento 0,2 mm, largura 0,8 mm, vértice 0,24 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,3 mm; II, 0,96 mm; III, 0,4 mm; IV, 0,4 mm. **Pronoto:** comprimento 0,5 mm, largura na base 1,0 mm. **Cúneo:** comprimento 0,40 mm, largura na base 0,36 mm.

Coloração geral picea, brilhante, com áreas tendendo a castanhas e pubescência achatada, prateada sob luz incidente; segmentos II-IV da antena e olhos (com tintura avermelhada), tendendo a castanho; hemiélitros negros (no alótipo a porção distal do clavo e a região mediana do cório tendem a castanho); membrana fusca, com pubescência escamiforme muito curta (sob luz incidente).