

hialinos, translúcidos; membrana translúcida, nervuras castanhas.

Lado inferior de castanho-escuro a preto; xifo do prosterno, coxas I e II (exceto as bases), peritrema ostiolar e metade basal dos fêmures, pálido-amarelados; tíbias castanhas, o primeiro e segundo par com estreito anel ou área pálida do terço apical.

Características morfológicas como mencionadas para o gênero.

*Genitália*: pênis (fig. 11) com abertura do gonopóro secundário típica (figs. 12-13) dois lobos membranosos. Parâmero esquerdo (fig. 14) com lobo basal desenvolvido e revestido de pêlos ou cerdas muito longos. Parâmero direito (fig. 15) simples, como mostra a figura.

*Fêmea*: desconhecida.

*Holótipo*: macho, Sinop. Rio Teles Pires, Mato Grosso, Brasil. IX. 1974, Alvaren-

ga & Roppa col., na coleção do primeiro autor.


A espécie possui, como foi dito atrás, aspecto geral de outras incluídas no gênero *Eustictus* Uhler, 1909, diferenciando-se facilmente pela longa pubescência das tíbias posteriores.

### *Zanchismella* n. gen.

(Figs. 16, 29-31)

Caracterizado pela presença de dois longos espinhos originários da área dos calos no pronoto.

DERAECORINAE, SURINAMELLINI. Corpo alongado, brilhante, com cerdas rijas, curtas, erectas e pêlos muito curtos e esparsos. Cabeça de aspecto arredondado, olhos grandes, ocupando praticamente quase toda a superfície lateral da cabeça, até a gula inferior-



*Krainacoris pilosus* n. sp. — Fig. 11: pênis; figs. 12, 13: gonoporo secundário; fig. 14: parâmero esquerdo; fig. 15: parâmero direito.