



Rhinocapsidea nordestina n. sp. — Fig. 8: Pênis; fig. 9: parâmero esquerdo; fig. 10: parâmero direito.

antena pálido-amarelada, segmento II negro na metade apical, segmento III-IV negros, pálidos na base; olhos castanhos. Lado inferior e pernas pálido-amarelados, abdômen preto-metálico. Em alguns exemplares o escutelo mostra-se esbranquiçado, com faixa longitudinal mediana e extremo ápice fuscas.

Corpo liso, brilhante, glabro, vértice fortemente carenado.

Genitália: Pênis (fig. 8) com vésica muito complexa, possuindo numerosas ramificações, algumas delas com dentes esclerosados na porção apical. Parâmero esquerdo (fig. 9) com lobo basal retorcido e afilado no ápice, ramo mais alongado provido de dentes marginais. Parâmero direito (fig. 10) também bifurcado e com dentes no ápice das ramificações.

Fêmea: Semelhante ao macho em coloração e aspecto geral. Comprimento 4,0 mm, largura 1,7 mm. **Cabeça:** comprimento 0,2 mm, largura 0,9 mm, vértice 0,44 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,4 mm; II, 1,3 mm; III e IV mutilados. **Pronoto:** comprimento 0,7 mm, largura na base 1,4 mm. **Cúneo:** comprimento 0,52 mm, largura na base 0,48 mm (alótipo).

Holótipo: macho, Estrada Rio-Bahia, Km 965, Motel da Divisa, 960 m, Encruzilhada, Bahia, Brasil, XI.1972, Seabra & Roppa, na coleção do primeiro autor. **Alótipo:** fêmea, idem. **Parátipo:** 2 machos, mesmas indicações que o holótipo, nas coleções do Museu Nacional e do primeiro autor.

Difere de *Rhinocapsidea genetiva* (Distant, 1884) pela coloração geral do corpo e pela morfologia da genitália do macho.

Neella ecuatoriana n. sp.

(Figs. 11-15)

Caracterizada pela coloração lutescente e pela morfologia da genitália do macho.

Macho: Comprimento 4,8 mm, largura 2,4 mm. **Cabeça:** comprimento 0,3 mm, largura 1,2 mm, vértice 0,52 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,3 mm; II, 1,1 mm; III e IV mutilados. **Pronoto:** comprimento 0,9 mm, largura na base 1,6 mm. **Cúneo:** comprimento 1,28 mm, largura na base 0,80 mm (holótipo).

Coloração geral lúteo-avermelhada, pouco mais escura na região claval; olhos pretos; antena negra a fusca, segmento I lutescente. Lado inferior lutescente a avermelhado, pernas lutescentes.