Auchus schubarti n.sp.

(Fig. 4)

Caracterizada pela forma do segundo segmento da antena do macho.

Macho: comprimento 4,4 mm, largura 1,7 mm. *Cabeça:* comprimento 0,4 mm, largura 0,8 mm, vértice 0,40 mm. *Antena:* segmento 1, comprimento 0,44 mm, largura no ápice 0,40 mm; II, 1,8 mm, maior largura 0,48 mm; III, 0,3 mm; IV, 0,2 mm. *Pronoto:* comprimento 1,1 mm; largura na base 1,4 mm. *Cúneo:* comprimento 0,60 mm, largura na base 0,44 mm (holótipo).

Coloração geral pálido-amarelado com áreas castanhas ou avermelhadas; cabeça e pronoto castanho claro, área dos calos pálida, escutelo castanho com faixa triangular mais escura longitudinalmente; hemiélitros pálido-amarelados, sutura claval enegrecida, sutura embólio-corial avermelhada, commissura corial com pequena mancha escura de cada lado, convergentes; margem apical interna do cúneo avermelhada; membrana com nervuras e mancha mediana escuras; antena com segmento I e II avermelhados, este último pálido na porção apical, segmentos III e IV castanho-avermelhados. Lado inferior castanho, ápice das coxas e pernas pálido-amareladas.



Fig. 4 — **Auchus schubarti** n. sp., macho, holótipo.

Corpo com pilosidade erecta, antena com segmentos I e II foliáceos, este último com a extremidade apical afilada, suturas cório-embolial e cório-claval com pontuações, cúneo mais longo que largo na base, membrana pilosa, translúcida.

Genitalia do tipo Hyaliodini, perdida durante a disseção do pigóforo.

Fêmea: desconhecida.

Holótipo: macho, BRASIL: Amazonas, Br 174, km 153, 14.VI.1977, Norman D. Penny col., na Coleção de Entomologia do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus.

Difere das demais espécies do gênero pela forma peculiar do segmento II da antena *(vide* Carvalho e Knight, 1943 e Carvalho 1974).

O nome específico é dado em homenagem ao Doutor Herbert Schubart, Diretor Adjunto do INPA em reconhecimento pela valiosa contribuição prestada a pesquisadores na Amazônia.

Summary

The author describes three new species of Hemiptera, Miridae from the neighbourhood of Manaus, as follows: **Platyscytus manauensis** n. sp., P. das Laranjeiras; **Anomalocornis ariasi** n. sp., P. das Laranjeiras e **Auchus schubarti** n. sp., Br-174 (Highway), Km 153, Amazonas. Illustration of the three new species are included.