

MIRÍDEOS NEOTROPICAIS, CCXXXV: DESCRIÇÃO DE NOVO GÊNERO E NOTAS TAXONÔMICAS SOBRE ESPÉCIES SULAMERICANAS (HEMIPTERA)¹

JOSÉ C. M. CARVALHO*

e

MARIA LUIZA FELIPPE*

Museu Nacional, Rio de Janeiro, RJ

Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ

(Com 14 ilustrações no texto)

Os autores apresentam considerações taxonômicas sobre *Acegima* Poppius, 1921, *Taedia aeruginosa* (Berg, 1892) *n. comb.*, *Sysinas semiluteus* Stål, 1860) *n. comb.* e descrevem um novo gênero para abrigar *Aspidobothrus rarus* Carvalho, 1950.

Os desenhos que ilustram o texto são de autoria de Luiz Antonio Alves Costa e do segundo autor.

Acegima Poppius, 1921

Acegima Poppius, 1921: 47

Este gênero vem até o presente sendo tratado entre os demais da tribo Herdoniini Distant, 1904.

Descrito em 1921 por Poppius in Poppius & Bergroth, 1921, de exemplar da Bolívia, possuía até 1974 uma única espécie: *albofasciata*.

O tipo (monobásico) foi encontrado por Carvalho em Helsinki com o rótulo de *Achilonotus albofasciatus* n. gen. et sp., Poppius det., Mus. Zool. Helsinki, Spec. typ. n. 7785, Bolivien, Prov. Sara Steimbach S. e publicado com o nome de *Acegima* (Poppius, 1921: 47). É um exemplar macho. Na descrição original figura na "Div. Capsaria" entre os "der mit *Xenetus* Dist. verwandten Gattungen".

Ao rever a tribo Herdoniini Carvalho (1973:109, figs. 1 e 3) manteve o gênero entre os Herdoniini, já

que o gonoporo secundário da espécie tipo assim parecia indicar. O tipo foi ilustrado e mais duas espécies incluídas no gênero e descritas como novas.

Estudos recentes, no entanto, nos mostram que o gênero, pelas características peculiares do gonoporo secundário e pela sua extrema convergência com a Tribo Ceratocapsini Knight, poderia ser incluído nesse grupo.

Os autores desejam assim chamar a atenção do taxonomistas da família sobre esses aspectos peculiares de *Acegima* Poppius, que possuindo o parempódio membranoso e divergente apresenta, no entanto, uma abertura peculiar do gonoporo secundário e grande convergência com exemplares da Tribo Ceratocapsini Knight. Baseando-se no parempódio o gênero continua sendo incluído entre os Herdoniini Distant.

Taedia aeruginosa (Berg, 1892) *n. comb.*

Lygus aeruginosus Berg, 1892: 88

(Fig. 1 – 3)

Esta espécie descrita por Berg antecedeu a *Lygus aeruginosus* Reuter, 1907 renominada por Bergroth, 1910 como *Lygus aeruginatus*, originária da Jamaica, foi incluída por Carvalho no volume IV dos mirídeos do mundo no gênero *Lygus* Hahn, "sensu lato", já que o autor não tivera oportunidade de manusear exemplares.

¹ Aceito para publicação em 13 de abril de 1983.
Distribuído em 30 de agosto de 1983.

* Bolsista do CNPq.