

MIRÍDEOS NEOTROPICAIS, CCXLIV: GÊNERO *ARAUCANOCORIS* N. GEN. COM DESCRIÇÃO DE OITO ESPÉCIES NOVAS (HEMIPTERA)¹

JOSÉ C. M. CARVALHO

Museum Nacional, Rio de Janeiro

(Com 52 ilustrações no texto)

Durante o ano de 1952 o autor recebeu material entomológico proveniente da região norte do Chile, principalmente das regiões do deserto de Atacama e arredores de Coquimbo. Parte da coleção foi remetida pelo colega Kuschel, que devidamente ilustrado permaneceu 30 anos aguardando publicação, na esperança de receber nova remessa de material recente e coligido com maior cuidado. Face a impossibilidade de nova coleta e tratando de espécies facilmente reconhecíveis pela morfologia da vésica e dos parâmeros, o autor decidiu entregar o estudo para publicação. Nele foram encontrados um gênero e oito espécies novas que são descritas como se segue:

Araucanocoris n.gen.

Orthotylinae, Orthotylini. Corpo liso, alongado nos machos e compacto nas fêmeas, revestido de pêlos negros misturados com pêlos prateados sob luz incidente, em algumas espécies dando a impressão de pêlos escamiformes.

Cabeça vertical, vértice bastante largo, fronte arredondada, vértice provido de carena arredondada e baixa, desprovida de cerdas erectas, jugo e loro desenvolvidos, largos, clipeo pouco saliente, rostro alcançando as coxas posteriores na maioria das

espécies ou avançando até o meio do abdome ou apenas até as coxas medianas, olhos contíguos ao pronoto, antena cilíndrica, segmento I mais grosso que os demais, bem mais curto que a largura do vértice e com algumas cerdas erectas. Segmento II cerca de seis vezes mais longo que o I, revestido de pilosidade curta.

Pronoto trapezoidal, cerca de três vezes mais largo que longo, colar obsoleto, deprimido, calos distintos, margens laterais arredondadas, margem posterior largamente arredondada ou muito levemente reentrante; mesoescuto coberto ou ligeiramente exposto, escutelo pequeno, pouco saliente.

Hemiélitros de lados paralelos (machos), embólio bem delineado, de largura igual em toda sua extensão, nervuras do cório moderadamente marcadas, cuneo visivelmente mais longo que largo na base (machos), membrana bem desenvolvida (machos), braquipectera ou de comprimento reduzido (fêmeas), variando no comprimento (algumas espécies possuem membrana atingindo apenas o segmento VII do abdome, com cuneo arredondado externamente e membrana vestigial ou ausente).

Pernas de comprimento moderado, tíbias guardadas de pêlos e espinhos, pêlos comuns e denticulos esclerosados, parempodium do tipo Orthotylini.

Espécie tipo do gênero: *Araucanocoris araucanus* n.sp.

Aproxima-se pelo aspecto geral de *Fieberocapsus* Carvalho & Southwood, 1955, diferenciando-se pela presença de cuneo e membrana; assemelha-se também a *Orthotylus* Fieber, 1858 mas dele se

¹ Aceito para publicação em 7 de julho de 1983.

Distribuído em 30 de Novembro de 1983.

* Pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).