

63. — *punctulatus* (FALL.), weniger häufig als *D. lutescens*, weit verbreitet, an Kräutern auf sandigem Boden, auch in Meckl., Thür. und Sa. gefunden. Paläarktische Art.
Fundorte: 74: Chorin DAHL (1912); 75: Fürstenberg X 1876 u. XI 1878 u. IV 1889 KONOW; 77: Prignitz JAAP, Triglitz WAGNER (1939); 78: Lehnitz VIII 55 KNAUSS; 79: Mühlenbeck IX 34, Rüdersdorf IV 02 ENDERLEIN; 80: Lebus VIII 70 GÖLLNER, Reitwein III 57 ZEBE; 81: Albr. Teerofen IX 42 GRIEP, Glindow VI 40 u. IX 42 u. VIII 43 GRIEP, Grunewald, Mittenwalde SCHIRMER (1918)/VI 32/IX 66 GÖLLNER, Potsdam KONOW/IX 42 GRIEP, Ruhlsdorf NOWAK (1964), Sperenberg IX 30; 82: „Bln.“ BAERENSPRUNG/SCHIRMER & SCHUMACHER (1911), Dubrow VIII 27 UDE, Gosen IX 30; 87: Plaue VIII 70 SCHUMMER.
64. — *annulipes* (H. S.), sehr selten, im Gebirge häufiger, an *Larix*, auch in Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-sibirische Art.
Fundorte: 81: Potsdam V–VI 53 GRIEP; 84: Gr. Gaglow VI 68.
65. — *olivaceus* (F.), selten gesammelt, sonst nicht selten und verbreitet, lebt räuberisch auf Laubbäumen, auch in Meckl., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-maghrische Art.
Fundorte: 75: Eberswalde; 78: Lehnitz VIII 62 KNAUSS; 80: Frankfurt VI 18; 81: Dahlem VI 39 HEDICKE, Bohnsdorf ZELETZKI & RINNHOFFER (1966), Potsdam VII 46 u. VI 48 GRIEP; 84: Calau VII 67.
66. — *ruber* (L.), häufig gesammelt, nach WAGNER nicht selten und weit verbreitet, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-maghrische Art.
Fundorte: 75: Werbellinsee VIII 69 ECKERT; 78: Lehnitz VII u. VIII 61 KNAUSS; 79: Hobrechtsfelde VII 67 JAESCHKE, Schildow VIII 44, Strausberg STOBBE; 80: Mescherin WAGNER (1941), Lebus VIII 35 ZWICK; 81: Bornim VII 44 GRIEP, Eiche VII 41 GRIEP, Genshagener Heide VII 69 SCHULZE, Glindow VII 38 u. VIII 41 u. VII 43 GRIEP, Golm VII 41 GRIEP, Hermannswerder VII 43 GRIEP, Luckenwalde VIII 68 HERTZEL, Kl. Machnow VII 66 ECKERT/VIII 66 GRUEL, Mittenwalde VIII 67 GÖLLNER, Pfaueninsel STICHEL (1926), Potsdam VIII 41 u. VII 42 GRIEP, Wildpark VII 50 u. VIII 55 GRIEP; 82: „Bln.“ BAERENSPRUNG/SCHIRMER & SCHUMACHER (1911)/SCHUMACHER (1913 u. 1914)/IX 44 LICHTWARDT, Wernsdorf VII 67 SCHADE; 85: Bardenitz VIII 69 SCHUMMER; 87: Plaue VIII 70 SCHUMMER, Weißwasser VII 66 ENGELMANN.
67. — *scutellaris* (F.), nicht selten, an *Erica* und *Calluna*, auch in Meckl., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-sibirische Art.
Fundorte: 74: Chorin SCHUMACHER (1913); 78: Lehnitz SCHUMACHER (1913), Seefeldt SCHUMACHER (1913); 79: Buckow SCHIRMER & SCHUMACHER (1911); 80: Mescherin WAGNER (1941); 81: Glindow VII 41 u. VII 42 u. 43 u. VII 53 GRIEP, Grunewald, Potsdam VI 08 LICHTWARDT/VII 42 GRIEP, Wannsee VII 20 OLDENBERG; 82: „Bln.“ BAERENSPRUNG/SCHUMACHER (1913), Kagal SCHUMACHER (1913), Rahnsdorf SCHUMACHER (1913).
68. — *trifasciatus* (L.), häufig, an Laubbäumen, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-mediterrane Art.
Fundorte: 77: Prignitz VI 19 JAAP; 78: Brieselang VII 44 MÜLLER, Finkenkrug VI–VII 17 u. VII 22 OLDENBERG, Lehnitz VI 54 u. VI 59 KNAUSS; 79: Buckow SCHIRMER & SCHUMACHER (1911), Strausberg VI 16 P. SCHULZE; 80: Frankfurt VI 18; 81: Ferch VI 38 GRIEP, Golm VII 41 GRIEP, Pfaueninsel STICHEL (1926)/VI 40 GRIEP, Potsdam VII 42 u. V 48 GRIEP, Stahnsdorf VI 43 GRIEP, Wildpark VI 54 GRIEP; 82: Friedrichshagen VIII 62 KNAUSS, Grünau VIII 05 BERGMANN, Störitzsee VI 62 OEHLKE; 83: Spreewald VI 07 STOBBE; 84: Gr. Gaglow VI 68.
69. — *ventralis* REUT., selten, verbreitet, wenn vorhanden, recht häufig, vorhandene Exemplare vorwiegend an klimatisch günstigen jedoch rel. trockenen Biotopen gefangen, in keinem der Nachbargebiete bis jetzt gefunden. Pontische Art.
Fundorte: 80: Lebus VI 67 GÖLLNER, Schiffmühle VII 69 SCHULZE; 81: Glindow WAGNER (1967), Kl. Machnow VII 66 GRUEL, Mittenwalde VI 65 u. VII 67 GÖLLNER; 82: Kolberg VII 65.
70. *Alloeotomus germanicus* WAGN., wenige Funde, jedoch erst 1939 beschrieben, sonst häufig und verbreitet an Nadelholz (bes. *Pinus*), auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäische Art.
Fundorte: 74: Geesow WAGNER (1941); 78: Lehnitz X 62 KNAUSS; 79: Frohnau VII 34 STICHEL, Schildow VIII 44; 80: Gartz WAGNER (1941), Mescherin WAGNER (1941); 81: Luckenwalde VIII 68 HERTZEL, Mittenwalde X 66 SCHULZE, Nahmitz IX 41 H. WAGNER.
71. — *gothicus* (FALL.), nicht selten, an Nadelholz, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäische Art.
Fundorte: 77: Prignitz VIII 19 JAAP, Triglitz WAGNER (1939); 78: Hermsdorf VIII 44; 79: Schildow GREINER & SIEFKE (1933); 80: Gartz Wagner (1941), Mescherin WAGNER (1941); 81: Glindow VII–VIII 43 GRIEP, Mittenwalde SCHIRMER (1918)/VII 66 GÖLLNER, Pfaueninsel STICHEL (1926), Potsdam VIII 42 GRIEP, Wildpark VII 39 GRIEP; 82: „Bln.“ IX 03 BREDDIN/SCHUMACHER (1913), Charlottenburg VII 14 GENNERICH; 84: Gr. Gaglow VII 68.
72. *Macrotophus nubilis* (H. S.), nur drei Funde, sonst nicht selten und verbreitet, an *Stachys silvatica* L., auch in Meckl., Anh. und Sa. (sehr selten) gefunden. (Die Art soll früh er-