

- Fundorte: 75: Fürstenberg VI 1889 KONOW; 77: Prignitz VI 19; 78: Finkenkrug VII 20 HÖHNE, Heiligensee VII 19 HÖHNE, Nd. Neuendorf VI 22; 79: Schildow GREINER & SIEFKE (1933); 80: Freienwalde SCHUMACHER (1913), Mescherin WAGNER (1941); 81: Bornim VII–VIII 44 GRIEP, Golm VIII 44 GRIEP, Grunewald SCHUMACHER (1913), Hermannswerder VI 43 GRIEP, Hundekehle SCHUMACHER (1913), Pfaueninsel STICHEL (1926), Potsdam VI 47 GRIEP, Wildpark VI 50 u. VI 53 GRIEP; 82: Jungfernheide VI 50, Schmöckwitz SCHUMACHER (1913); 85: Fläming VII 1894 BREDDIN.
83. *Acetropis carinata* (H. S.), sehr häufig und verbreitet, an trockenen Orten an Gräsern, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-mediterrane Art.
Fundorte: 74: Chorin VI 32, Geesow WAGNER (1941); 75: Fürstenberg VI 1891 KONOW; 77: Bork? VI 14 GENNERICH, Prignitz VI 19 JAAP, Triglitz WAGNER (1941); 78: Finkenkrug VI 19 HÖHNE/VII 28, Nauen VII 07 SCHUMACHER; 79: Buch VI 20 HÖHNE, Buckow SCHIRMER & SCHUMACHER (1911), Eggersdorf VI 49, Hönow VI 20 HÖHNE, Rüdersdorf VII 19 HÖHNE, Strausberg Torfhaus VII 65 GÖLLNER; 80: Frankfurt VI 28 SCHUKATSCHEK, Gartz WAGNER (1941), Lebus VI 68–69 SCHULZE, Mescherin WAGNER (1941), Schiffmühle VII 69 GÖLLNER, Zäckerick VI 41 H. WAGNER; 81: Albr. Teerofen VI 41 GRIEP, Beelitz Heilst. VI 41 GÜNTHER, Dahlem VI 12 KUNIKE, Glindow VI 43 GRIEP, Kl. Machnow V 20 STICHEL, Mittenwalde VII 19 HÖHNE/VI 66 u. 67 GÖLLNER, Potsdam VI 47 u. V 53 GRIEP, Stahnsdorf VI 22 OLDENBERG, Wannsee VI 22 OLDENBERG, Wildpark VI 55 GRIEP; 82: Baumschulenweg SCHUMACHER (1912), „Bln.“ BAERENSPRUNG/SCHUMACHER (1914), Erkner VII 50 HAUCHECORNE.
84. – *gimmerthali* FLOR., nur zwei Funde, an trockenen Orten an Gräsern, außerdem nur in Sa. gefunden. Europäische Art.
Fundorte: 80: Mescherin WAGNER (1941); 82: „Bln.“ BAERENSPRUNG/SCHUMACHER (1913).
85. *Leptopterna dolabrata* (L.), häufig und verbreitet, an Gräsern, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. häufig gefunden. Holarktische Art.
Fundorte: 75: Fürstenberg VII 1874 KONOW, Werbellinsee VII 69 ECKERT; 77: Prignitz VI 19 JAAP; 78: Finkenkrug VII 00 KUHLGATZ/VII 02 RIGER/VII 19 HÖHNE/VII 28, Heiligensee VII 19 HÖHNE, Hermsdorf VI 01 KUHLGATZ, Lehnitz VI 58 KNAUSS, Nauen VII 07 SCHUMACHER; 79: Buch VII 70 SCHUMMER, Mühlenbeck VI 32, Rüdersdorf VI 68 GIESE, Schildow GREINER & SIEFKE (1933), Strausberg Torfhaus VII 65 GÖLLNER; 80: Gartz WAGNER (1941), Lebus VI 67–69 GÖLLNER; 81: Albr. Teerofen VI 41 GRIEP, Grunewald VI 14 GENNERICH, Mittenwalde VI 67 GÖLLNER, Potsdam VII 42 GÜNTHER, Ruhlsdorf VI 63 NOWAK, Sacrow VII 02 ENDERLEIN; 82: Baumschulenweg SCHUMACHER (1912), „Bln.“ BAERENSPRUNG/SCHUMACHER (1913 u. 1914), Wernsdorf VII 67 SCHADE.
86. – *ferrugata* (FALL.), sehr häufig und verbreitet, an Gräsern, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. häufig gefunden. Holarktische Art.
Fundorte: sehr ähnlich denen von *L. dolabrata* (L.).
87. *Teratocoris antennatus* (BOH.), nur wenige ältere Funde, nach WAGNER verbreitet und selten, an Schilf und Riedgräsern an feuchten Biotopen, auch in Meckl., Anh. und Sa. wenig gefunden. Europäisch-sibirische Art.
Fundorte: 74: Chorin SCHUMACHER (1913); 79: H. Schönhausen VII 19 HÖHNE; 82: „Bln.“ SCHUMACHER (1913), Charlottenburg SCHUMACHER (1913).
88. – *paludum* SAHLBG., nur ein Neufund, nach WAGNER selten und zerstreut, ebenfalls an Schilf und Riedgräsern an feuchten Biotopen, in den Nachbargebieten nur in Sa. gefunden. Boreo-montane Art.
Fundorte: 80: Lebus VIII 68 u. VI/VIII 69 GÖLLNER.
89. *Stenodema calcaratum* FALL., sehr häufig und verbreitet, an Gräsern an feuchten aber auch trockenen Biotopen, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-palarktische Art.
Fundorte: 75: Werbellinsee VII 69 ECKERT; 77: Prignitz 19 JAAP, Schönberg IV 1875 KONOW, Triglitz WAGNER (1941); 78: Finkenkrug X 1898 KUHLGATZ/V u. VII 19 u. 20 HÖHNE/V 28, Spandau X 35 ZWICK; 79: Blumberg VII 70 HIEKE, Hennickendorf X 65 GÖLLNER, Mühlenbeck VI 32, Rüdersdorf V–VII 68 GIESE, Schildow GREINER & SIEFKE (1933), Schönow VII 19 HÖHNE, Summt VII 71 GÖLLNER; 80: Lebus VI 67 u. VI–VII 68 u. VI–VIII 69 GÖLLNER, Mescherin WAGNER (1941), Schiffmühle VII 69 GÖLLNER; 81: Hundekehle VIII 19 HÖHNE, Kl. Machnow VII 66 GRUEL, Mittenwalde IX 31/VIII 65 u. 66 GÖLLNER, Pfaueninsel STICHEL (1926), Rietz IX 70 SCHUMMER, Ruhlsdorf VII 63 NOWAK, Stahnsdorf VII 40, Wildpark VII 50 GRIEP; 82: Baumschulenweg SCHUMACHER (1912), „Bln.“ BAERENSPRUNG/SCHUMACHER (1914), Dubrow VIII 27 UDE, Erkner VII 50 HAUCHECORNE, Fangschleuse VIII 27 UDE, Friedrichshagen VII 69 GÖLLNER, Wernsdorf VII 67 SCHADE; 83: Lakoma IX 70 DIECKMANN, – Weißwasser V u. VII 66 ENGELMANN.
90. – *holsatum* (F.), selten gefunden, nach WAGNER häufig und verbreitet, an Gräsern auf Waldwegen und Lichtungen, wahrscheinlich mehr in bergigen Lagen zu finden, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-sibirisch-maghribische Art.
Fundorte: 77: Prignitz IX 19 JAAP, Schönberg V 1875 KONOW; 78: Finkenkrug IX 1898 KUH-