

- Fundorte: 77: Prignitz JAAP, Triglitz WAGNER (1939); 78: Finkenkrug SCHIRMER & SCHUMACHER (1911)/SCHUMACHER (1913)/VI 14 PHILIP/V 18 u. V 21 u. VI 22 OLDENBERG, Nd. Neuendorf V 31 LASS; 79: Buckow VI 01 OLDENBERG, Schildow GREINER & SIEFKE (1933), Strausberg SCHUMACHER (1913); 81: Glindow V–VI 42 GRIEP, Jünsdorf V 47, Mittenwalde VII 67 GÖLLNER, Pfaueninsel V 20 HÖHNE/STICHEL 1922 u. 1926, Potsdam VI 38 u. V 46 GRIEP, Saarow OLDENBERG, Stahnsdorf OLDENBERG; 82: „Bin.“ SCHUMACHER (1913 u. 1914).
125. *Brachycoleus decolor* (REUT.), nicht selten, bevorzugt an klimatisch begünstigten Fundorten auftretend, nach WAGNER weit verbreitet, fehlt im Nordwesten, an Umbelliferen und *Euphorbia*, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. nicht häufig gefunden, Europäisch-sibirische Art.
Fundorte: 74: Brodowin SCHUMACHER (1913), Chorin SCHUMACHER (1913), Geesow WAGNER (1941), Oderberg SCHUMACHER (1913), Parstein SCHUMACHER (1913); 79: Buckow SCHIRMER & SCHUMACHER (1913), Hönow VI 20 HÖHNE, Rüdersdorf SCHIRMER & SCHUMACHER (1911); 80: Freienwalde SCHUMACHER (1913), Lebus VI 67–68 GÖLLNER, Liepe SCHUMACHER (1913), Mescherin WAGNER (1941), Wriezen SCHUMACHER (1913); 82: „Bin.“ BAERENSPRUNG/SCHUMACHER (1913).
126. *Stenotus binotatus* (F.), häufig, an Gräsern und Kräutern an feuchten Orten, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden, Holarktische Art.
Fundorte: 74: Geesow VII 67 GÖLLNER; 75: Werbellinsee VII–VIII 69 ECKERT; 77: Prignitz JAAP, Schönberg VII 1875 KONOW; 78: Bredow VII 31 LASS, Finkenkrug VIII 19 u. VII 20 HÖHNE, Nauen VII 07 SCHUMACHER; 79: Buckow SCHIRMER & SCHUMACHER (1911), Schildow GREINER & SIEFKE (1933); 80: Gartz VII 67 GÖLLNER, Lebus VI u. VIII 67 u. VI–VII 68 GÖLLNER, Schiffmühle VII 69 SCHULZE; 81: Golm VII 41 GRIEP, Hermannswerder VII 42 GRIEP, Potsdam VII 41 u. 42 GRIEP/VII 67, Wildpark VII 38 u. 50 GRIEP, Zehlendorf; 82: „Bin.“ BAERENSPRUNG/SCHIRMER & SCHUMACHER (1911/VII 28, Wernsdorf VII 67 SCHADE).
127. *Dichroscytus rufipennis* (FALL.), selten, nach WAGNER häufig und verbreitet, zoophag an Nadelhölzern, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden, Europäische Art.
Fundorte: 77: Prignitz JAAP, Schönberg VI 1875 KONOW; 78: Lehnitz VI 58 KNAUSS; 79: H. Schönhausen VI 16 HÖHNE; 80: Frankfurt VI 67; 81: Glindow VII 44 GRIEP, Potsdam VI 46 GRIEP.
128. *Plestocoris rugicollis* (FALL.), nur drei Funde, nach WAGNER nicht häufig, verbreitet, besonders an *Salix* und *Pirus*, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden, Europäisch-sibirisch-maghrische Art.
Fundorte: 80: Lebus VII 68 GÖLLNER; 81: Lindstedt IV 50 GRIEP; 82: „Bin.“ BREDDIN.
129. *Lygus pabulinus* (L.), häufig und verbreitet, an krautigen Pflanzen und Laubhölzern (*Salix*, *Alnus*), auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden, Holarktische Art.
Fundorte: 74: Chorin V 36; 77: Prignitz JAAP, Schönberg VIII 1875 KONOW; 78: Finkenkrug VI 19 HÖHNE; 79: H. Schönhausen V 19 HÖHNE, Rüdersdorf VII 19 HÖHNE/VIII 68 GIESE, Schildow GREINER & SIEFKE (1933), Summt VIII 71 GÖLLNER; 80: Frankfurt VII 68, Lebus VIII 67 u. 69 GÖLLNER, Mescherin WAGNER (1941); 81: Albr. Teerofen VI 41 GRIEP, Glindow VIII 41 GRIEP, Hermannswerder VIII 42 GRIEP, Lichtenfelde IX 52 V. KELER, Mittenwalde VIII 67 GÖLLNER, Nikolassee VII 12 HEYMONS, Pfaueninsel STICHEL (1926), Potsdam VI 47 GRIEP; 82: Baumschulenweg SCHUMACHER (1912).
130. – *contaminatus* (FALL.), nicht selten und weniger häufig als vorige Art gefunden, nach WAGNER häufig und verbreitet, an Laubhölzern (*Salix*, *Betula*, *Alnus*), auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden, Holarktische Art.
Fundorte: 74: Brodowin VIII 32; 75: Eberswalde VI 65, Fürstenberg VIII 1877 KONOW; 77: Prignitz JAAP, Schönberg VII 1875 KONOW, Triglitz WAGNER (1939); 78: Finkenkrug VI 02 ENDERLEIN, Kremmen VI 37 ZWICK; 79: Schildow GREINER & SIEFKE (1933)/VII 44; 80: Lebus VI 68 GÖLLNER; 81: Hermannswerder VI 41 u. VIII 42 u. 43 GRIEP, Pfaueninsel STICHEL (1926), Potsdam VI 46 GRIEP, Sacrow VII 02 Enderlein; 82: Friedrichshagen VIII 62 JAESCHKE.
131. – *viridis* (FALL.), nur drei Fundorte, nach WAGNER häufig und verbreitet, an Laubhölzern (*Tilia*), auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden, Europäische Art.
Fundorte: 78: Hermsdorf VII 32; 80: Frankfurt IX 29 u. VI 31 SCHUKATSCHEK; 81: Potsdam VI 43 u. 46 u. 47 GRIEP.
132. – *limbatus* (FALL.), nur ein alter Fund, nach WAGNER nicht häufig, an *Salix* sp., auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. selten gefunden, Europäisch-sibirische Art.
Fundort: 82: „Bin.“ BAERENSPRUNG.
133. – *lucorum* (M. D.), häufig und verbreitet, an krautigen Pflanzen, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. häufig gefunden, Holarktische Art.
Fundorte: 75: Fürstenberg VIII 1877 KONOW; 77: Prignitz JAAP, Triglitz WAGNER (1939); 78: Finkenkrug VI 20/VII 27, Spandau VII 32; 79: Hönnow VII 30, Lübars X 30, Rüdersdorf VII 68 GIESE, Schildow GREINER & SIEFKE (1933)/IX 44, Strausberg Torfhaus VII 65 GÖLL-