

147. *Liocoris tripustulatus* (F.), häufig, an Waldrändern und Ruderalstellen, häufig auf *Urtica*, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-sibirisch-mediterrane Art.
Fundorte: 75: Werbellinsee VIII 69 ECKERT; 77: Prignitz JAAP, Triglitz WAGNER (1941); 78: Lehnitz IX 29 KNAUSS; 79: Buckow SCHIRMER & SCHUMACHER (1911), Rüdersdorf VII 68 GIESE, Schildow GREINER & SIEFK (1933), Spechthausen ZELETZKI & RINNHOFER (1968), Summt VIII 71 GÖLLNER; 80: Lebus VI u. VIII 67 u. VII 68 GÖLLNER; 81: Grunewald IX 50/VIII 52 V. KELER, Hermannswerder VII 41 GRIEP, Kl. Machnow VII 66 ECKERT, Mittenwalde VIII 67 GÖLLNER, Pfaueninsel STICHEL (1926), Potsdam II 38 u. VII 40 u. VI 47 u. VII 52 GRIEP; 82: „Bln.“ BAERENSPRUNG/SCHUMACHER (1914).
148. *Camptozygum aequale* VILL., häufig, an *Pinus*, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-maghribische Art.
Fundorte: 74: Geesow WAGNER (1941); 75: Fürstenberg X 1876 KONOW; 77: Prignitz JAAP, Triglitz WAGNER (1939); 78: Finkenkrug VI 31 LASS, Hermsdorf VIII 44, Paulinenau VII 32; 79: H. Schönhausen VII 19 HÜHNE, Strausberg VII 33 SIEFK; 80: Gartz WAGNER (1941), Mescherin WAGNER (1941); 81: Glindow VII 42–44 GRIEP, Grunewald VII 07 KUHLGATZ, Potsdam VII 46 GRIEP; 82: „Bln.“ BAERENSPRUNG/SCHIRMER & SCHUMACHER (1911), Grünau VIII 02 ENDERLEIN.
149. *Polymerus nigritus* (FALL.), nur wenige Funde, nach WAGNER zerstreut und im Norden häufiger, an sumpfigen Orten an *Galium*, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-sibirische Art.
Fundorte: 80: Lebus VI 67 GÖLLNER, Reitwein VI 67 GÖLLNER; 81: Teltow VI 31.
150. – *brevicornis* (REUT.), häufig, nach WAGNER verbreitet und nicht häufig, an trockenen Orten an *Galium verum* L., auch in Meckl., Anh. und Sa. gefunden. Europäisch-sibirisch-pontische Art.
Fundorte: 78: Birkenwerder SCHUMACHER (1909), Finkenkrug ENDERLEIN (1908), Nauen VII 07 SCHUMACHER/SCHUMACHER (1911), Oranienburg SCHUMACHER (1909), Paulinenau VII 32, Schwante SCHUMACHER (1909); 79: Podelzig VI 67 GÖLLNER, Rüdersdorf SCHUMACHER (1909), Strausberg Torfhaus VIII 65 GÖLLNER; 80: Gartz WAGNER (1941), Lebus VII 30/VI u. VIII 67 u. VII 68 u. VI u. VIII 69–70 GÖLLNER, Schiffsmühle VII 69 SCHULZE, Zäckericker Loose VI 41; 81: Beelitz Heilst. VI 41 GÜNTHER, Glindow VII 41 u. VIII 42 GRIEP, Golm VII 41 GRIEP, Kl. Machnow V 20 STICHEL, Sacrow SCHUMACHER (1909), Werder VII 41 GRIEP; 82: Baumschulenweg SCHUMACHER (1909), „Bln.“ SCHUMACHER (1911 u. 1914), Faßglocke SCHUMACHER (1909)/VIII 27 UDE, Hangelsberg VIII 27 UDE, Tegel VIII 27 UDE, Wilhelmshagen SCHUMACHER (1909); 83: Spreewald VIII 58 WINKLER.
151. – *cognatus* (FIEB.), nicht selten, auf trockenem Boden an krautigen Pflanzen (bes. *Salsola*), auch in Thür. und Sa. selten gefunden. Paläarktische Art.
Fundorte: 80: Frankfurth VIII 31 SCHUKATSCKE; 81: Albr. Teerofen IX 42 GRIEP, Glindow VII 42 GRIEP, Potsdam VII 42 GRIEP; 82: Baumschulenweg VII 07/SCHUMACHER (1909 u. 1912), Charlottenburg SCHUMACHER (1913)/X 21, Friedrichsfelde X 71 SCHULZE/X 71 HIEKE, Halensee SCHUMACHER (1913), Jungfernheide, Tiergarten SCHUMACHER (1913), Wilmersdorf SCHUMACHER (1913).
152. – *palustris* (Reut.), selten, früher jedoch vielfach als zu *unifasciatus* geh. aufgefaßt, an *Galium* auf feuchten Wiesen in Niederungen, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-sibirische Art.
Fundorte: 77: Prignitz JAAP; 78: Nauen SCHUMACHER (1913); 79: H. Schönhausen VII 19 HÖHNE; 80: Lebus VIII 67 u. VII–VIII 68 u. VIII 69–71 GÖLLNER; 81: Glindow VIII 42 GRIEP, Grunewald SCHUMACHER (1911 u. 1913), Schulzendorf VII 37 ZWICK; 82: „Bln.“ SCHUMACHER (1911 u. 1913).
153. – *unifasciatus* (F.), sehr häufig und verbreitet, auf trockenem Boden an *Galium*, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. häufig gefunden. Holarktische Art.
Fundorte: Weit verbreitet wie *Stenodema*-Arten.
154. – *vulneratus* (PZ.), häufig, an krautigen Pflanzen auf leichten Böden, auch in Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-sibirisch-mediterrane Art.
Fundorte: 74: Geesow WAGNER (1941); 75: Eberswalde KONOW; 77: Prignitz JAAP; 78: Borgsdorf SCHUMACHER (1909), Lehnitz VIII 31/VIII 61 KNAUSS, Oranienburg SCHUMACHER (1909); 79: Eggersdorf SCHUMACHER (1909), Mühlenebeck VI 32, Schildow GREINER & SIEFK (1933); 81: Albr. Teerofen IX 42 GRIEP, Glindow VIII–IX 41 u. VI 43 GRIEP, Mittenwalde SCHIRMER (1918)/VI 32/VIII 33 BISCHOFF, Potsdam VIII 51 GRIEP; 82: Baumschulenweg SCHUMACHER (1912), „Bln.“ BAERENSPRUNG, Dubrow VIII 27 UDE, Grünau SCHUMACHER (1909), Wilhelmshagen SCHUMACHER (1909); 83: Spreewald VIII 58 WINKLER.
155. *Charagochilus gyllenhali* (FALL.), nicht selten, an *Galium*-Arten, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Paläarktische Art.
Fundorte: 77: Prignitz JAAP; 78: Finkenkrug VI 23 OLDBERG/VII 28, Lehnitz VIII 61 KNAUSS, Paulinenau VII 32; 79: Hönow VII 30, Rüdersdorf VII–VIII 68 GIESE, Schildow IX 32/GREINER & SIEFK (1933); 80: Gartz WAGNER (1941), Lebus VI u. VIII 67 u. VIII 68