

- GÖLLNER; 81: Golm VII 41 GRIEP, Mittenwalde VIII 47/VIII 66 GÖLLNER, Wildpark VII 50 GRIEP; 82: „Bin.“ 28, Tegel VII 02 ENDERLEIN; 85: Belzig VI 30.
156. *Capsus ater* (L.), häufig, an Gräsern auf trockenen Wiesen, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. häufig gefunden. Holarktische Art.
Fundorte: 74: Geesow WAGNER (1941); 75: Werbellinsee VIII 69 ECKERT; 77: Prignitz JAAP, Schönberg VII 1877 KONOW; 78: Finkenkrug VI 02 ENDERLEIN/VII 02 RIGLER/V 30 OLDENBERG, Hermsdorf VI 01 KUHLGATZ, Nauen VII 07 SCHUMACHER; 79: Ahrensfelde VII 70 HIEKE, Buch VII 70 SCHUMMER, Buckow SCHIRMER & SCHUMACHER (1911), Hönow V 25 PRIEFERT, Rüdersdorf VI–VII 68 GIESE, Schildow GREINER & SIEFKE (1933); 80: Gartz WAGNER (1941), Lebus VI 67–68 u. VI u. VIII 69 GÖLLNER, Mescherin WAGNER (1941); 81: Bornim VII 44 GRIEP, Glindow VI 43 GRIEP, Golm VII 41 GRIEP, Grunewald VI 1897 OLDENBERG/VI 42 GÜNTHER, Mittenwalde VI 65 GÖLLNER, Pfaueninsel STICHEL (1926), Potsdam VI 18 u. 21 OLDENBERG/VII 42 GÜNTHER/VI 47 u. 52 GRIEP, Rietz VI 70 SCHUMMER, Ruhlsdorf VI–VII 63 NOWAK, Sacrow VII 02 ENDERLEIN, Wildpark VII 50 GRIEP; 82: „Bin.“ SCHIRMER & SCHUMACHER (1911)/SCHUMACHER (1914), Wernsdorf VII 67 SCHADE.
157. – *wagneri* REM., nur ein Neufund (aber erst 1950 beschrieben), nach WAGNER selten und zerstreut, auf feuchten Wiesen und *Calamagrostis lanceolata* Roth., auch in Sa. nur selten gefunden. Westlich-atlantische Art.
Fundort: Lebus VI 68 SCHULZE.
158. *Capsodes gothicus* (L.), häufig, an krautigen Pflanzen (*Galium*, *Hypericum*) und Gebüsch, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-sibirisch-mediterrane Art.
Fundorte: 75: Fürstenberg VII 1874 KONOW; 77: Prignitz JAAP, Triglitz WAGNER (1939); 78: Brieselang VI 13, Finkenkrug VII 00 KUHLGATZ/VI 01 ENDERLEIN/V 18 OLDENBERG/VI u. VII 19 HÖHNE/VI 31 LASS, Hermsdorf VI 01 KUHLGATZ, Nauen VII 07 SCHUMACHER/VI 19 HÖHNE; 79: Herzfelde VI 31 LASS, H. Schönhausen VI 19 HÖHNE, Rüdersdorf VI bis VIII 68 GIESE, Schildow GREINER & SIEFKE (1933); 80: Schiffmühle VII 69 SCHULZE; 81: Glindow VII 41 GRIEP, Golm VII 41 GRIEP, Mittenwalde VIII 31 LASS/VI 66 u. 67 GÖLLNER, Pfaueninsel STICHEL (1926), Potsdam VII 42 GÜNTHER/VI–VII 41 GRIEP, Sperenberg VI 30 LASS, Wildpark VII 39 GRIEP; 82: Baumschulenweg SCHUMACHER (1912), „Bin.“ SCHIRMER & SCHUMACHER (1911)/SCHUMACHER (1914), Kolberg VII 65 MÜLLER, Nd. Lehme VI 27 LASS, Wernsdorf VII 67 SCHADE.
159. – *cingulatus* (F.), selten, nach WAGNER im Süden verbreitet, an Liliaceen, auch in Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-mediterrane Art.
Fundorte: 78: Friesack SCHUMACHER (1913); 81: Glindow VII 41 u. 42 GRIEP, Trechwitz VI 42 GÜNTHER, Wildpark VII 56 GRIEP; 85: Grubo SCHUMACHER (1913).
160. *Halticus apterus* (L.), häufig und verbreitet, auf trockenem Boden, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Holarktische Art.
Fundorte: 74: Geesow WAGNER (1941), Oderberg VIII 65 MOHR; 77: Prignitz JAAP; 78: Bredow VII 31 LASS, Finkenkrug VII 19 HÖHNE/VII 28, Nauen VII 07 SCHUMACHER, Nd. Neuen-dorf VIII 24, Paulinenaue VII 32, Velten VIII 44; 79: Hönow VII 31 LASS, Rüdersdorf VII 24/ VIII 27 UDE/VI–VII 68 GIESE, Schildow GREINER & SIEFKE (1933)/VIII 44, Strausberg-Nord IX 69 GÖLLNER, Summt VIII 67 GÖLLNER; 80: Gartz WAGNER (1941), Lebus VI 68 u. VIII 69 bis 71 GÖLLNER, Mescherin WAGNER (1941), Schiffmühle VII 69 GÖLLNER; 81: Bornim VIII 44 GRIEP, Dahlewitz VII 31 LASS, Glindow VII 38 u. VIII 41 u. VII 42 GRIEP, Golm VII 41 GRIEP, Werder VII 41 GRIEP, Wildpark VII 52 GRIEP; 82: Baumschulenweg SCHUMACHER (1912), „Bin.“ BAERENSPRUNG/SCHUMACHER (1914), Fangschleuse VIII 27 UDE, Grünheide AULMANN, Wernsdorf VII 67 SCHADE, Zeuthen VII 07 OBST.
161. – *pusillus* (H. S.), nur ein Fund, nach WAGNER selten und sehr zerstreut, an *Galium*, *Ononis*, auch in Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-sibirische Art.
Fundort: 82: Baumschulenweg SCHUMACHER (1912).
162. *Strongylocoris leucocephalus* (L.), selten gefunden, nach WAGNER nicht selten, besonders im Nordosten und Süden, sowie in den Gebirgen, auf Trockenwiesen an *Campanula*-Arten, auch an Leguminosen, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. verbreitet. Paläarktische Art.
Fundorte: 77: Prignitz JAAP; 78: Nauen VII 07/SCHUMACHER; 79: Buckow SCHIRMER & SCHUMACHER (1911), Schildow GREINER & SIEFKE (1933), Strausberg VII 33 SIEFKE; 81: Pfaueninsel STICHEL (1926), Wildpark VII 50 GRIEP; 82: „Bin.“ BAERENSPRUNG; 85: Belzig VI 30.
163. – *luridus* (FALL.), nicht selten, auf Sandboden an *Jasione montana* L., auch in Meckl., Anh. und Sa. gefunden. Europäisch-maghribische Art.
Fundorte: 74: Chorin VI 32; 75: Fürstenberg VII 1874 u. VI 1890 KONOW; 77: Prignitz JAAP; 78: Finkenkrug VI 31 LASS; 79: Strausberg VII 33 SIEFKE; 80: Frankfurt VI 30 SCHUKAT-SCHEK, Lebus VI 68 SCHULZE; 81: Glindow VII 38 u. 41 u. 43 u. 44 u. VI 52 GRIEP, Kl. Machnow VII 12 BOLLOW, Mittenwalde VI 32/VII 65 GÖLLNER, Zehlendorf WAGNER; 82: Baumschulenweg SCHUMACHER (1912), „Bin.“ BAERENSPRUNG, Körbiskrug VII 36 LASS.