

тизирован. В габитусе, опушении и окраске также много общего с *Atractotomus*, но 2-й членик усиков у обоих полов не утолщен веретеновидно, а лишь слегка расширен к вершине. Вид живет в Вогезах, Альпах и Карпатах на *Abies* и *Larix*; описанный из Румынии *S. carbonarius* Horv., по-видимому, является лишь его темно окрашенной вариацией.

Род PSALLUS Fieb., 1858, sensu lato

Род распадается на следующие роды.

1. Род PSALLUS Fieb., 1858

Тип рода: *Psallus roseus* (F., 1776).

Округлые или коротко-овальные, реже продолговато-овальные. Окраска черная, красно-бурая, красная, оранжевая, редко желтоватая или беловатая. Опушение состоит из серебристых чешуек (иногда слабо уплощенных и сходных с волосками) и простых неуплощенных волосков, чаще черных или бурых. Генитальный сегмент большой, занимает $1/2$ — $1/3$ длины брюшка, снизу он часто с продольным килем. Эдеагус очень разнообразного строения, но всегда довольно массивный, изогнут С-образно или с несколько отогнутой вершиной, обычно с 1 вершинным отростком, часто имеются зубцы, дополнительные отростки, пластинки и другие образования; вторичный гонопор большой и всегда приближен к вершине, перепончатых образований в эдеагусе мало.

Из входящих в состав *Psallus* s. l. подродов *Coniortodes* и *Nanopsallus* ниже выделены в самостоятельные роды, а *Stenopsallus* выше синонимизирован с *Phoënicocoris*. Ниже из состава рода *Psallus* исключены еще 3 вида. Подроды *Ilops* Stich. (*Liops* Fieb.) и *Stigmocorista* Lindb. известны мне только по описанию, но по крайней мере последний не относится к *Psallus* s. str. Входящие в состав подрода *Apocremnus* Fieb. виды *P. kolenatii* Flor и *P. ancorifer* Fieb. несомненно не относятся к роду *Psallus* s. str., но я не имею достаточного материала для исследования их систематического положения. Остальные европейские виды подрода *Apocremnus*, а также подродов *Hylopsallus* E. Wagn., *Psallus* Fieb., *Pityopsallus* E. Wagn. и *Astenarius* Kerzh. образуют большую и разнообразную, но, по-видимому, все-таки единую группу, которую я считаю родом *Psallus* в узком смысле. Расчленение этого рода на подроды нуждается в дополнительном изучении. В роде *Psallus* несколько десятков видов, распространенных преимущественно в Палеарктике и Неарктике. Все виды живут на деревьях и являются зоофитофагами.

2. Род CONIORTODES (E. Wagn., 1952), stat. nov.

Psallus subg. *Coniortodes* E. Wagner, 1952

Тип рода: *Psallus salicellus* (H.-S., 1841)

Самостоятельность этого рода доказывается мною в другой статье (Труды Зоол. инст. АН СССР, 30).

3. Род NANOPSALLUS (E. Wagn., 1952), stat. nov.

Psallus subg. *Nanopsallus* E. Wagner, 1952

Тип рода и единственный вид: *N. carduella* (Horv., 1882) живет в Средиземноморье на *Cirsium asarum*. Описан ие и рисунки гениталий даны у Вайднера (Wagner, 1952). Род близок к *Coniortodes*; от *Psallus* s. str. хорошо отличается строением гениталий, окраской и биологией.

4. Род PLAGIOGNATHUS Fieb., 1858, подрод CHLORILLUS Kerzh., subgen. nov.

Тип подрода: *Psallus pictus* (Fieb., 1864).

Сюда относятся 2 вида: *P. pictus* Fieb. (рис. 80—85) и *P. alpinus* Reut. (рис. 86—91), которые включались ранее в род *Plagiognathus* Fieb., а затем