

ститута АН СССР, несущий типовое обозначение (золотой кружок) и надпись рукой Коленати «*Notostira caucasica*». Поскольку возможно, что в других музеях имеются еще другие котиры *N. caucasica*, я обозначил изученный мной экземпляр как лектоглотип. Экземпляры, определенные как *N. caucasica* Ройтером, Попшиусом и Кириченко, относятся отчасти к *N. elongata* Geoffr., отчасти к *N. erratica* L.

8. *Notostira erratica* (L., 1758) = *N. caucasica* subsp. *poppiusi* Reut., 1911, syn. nov., sec. subspec. paratyp. (♂, ♀) = *N. caucasica* var. *depicta* Reut., 1911, syn. nov., sec. var. typ. (♀ forma autumnalis).

9. *Orthotylus lenensis* Lindb., 1928 = *Lindbergocapsus lenaensis* E. Wagn., 1960, syn. nov. Большое сходство описаний и идентичность этикеток типовых экземпляров позволяют думать, что Вагнер по ошибке описал как новый вид под названием *L. lenaensis* типовые экземпляры *O. lenensis* Lindb. В качестве основного отличительного признака рода *Lindbergocapsus* Вагнер указывает наличие трех (!) парамеров; однако в действительности «средний парамер» является лишь несочлененным (!) выростом заднего края генитального сегмента; подобные выросты встречаются и у других *Orthotylus*. Все это заставляет сомневаться в родовой самостоятельности *Lindbergocapsus*.




Рис. 96—98 — *Chorosomella jakovlevi* Novv.

96 — эдеагус; 97 — левый парамер; 98 — правый парамер.

10. *Anapus rugicollis* (Jak., 1877), sec. spec. typ. = *A. sibiricus* (J. Sahlb., 1878), syn. nov. = *A. nigrita* (Jak., 1881), syn. nov., sec. spec. typ.

11. *Macrotylus elevatus* Fieb., 1858 = *M. fulvicornis* Jak., 1881, syn. nov., sec. spec. typ.

12. *Leucopteryx candidatum* Reut., 1879 (Hem. Gymn. Eur., 2 : 260) sec. spec. typ. (♂) = *L. fasciatum* Reut., 1879 (Ibid. : 261), syn. nov., sec. spec. typ. (♀) = *L. transversum* Jak., 1882, syn. nov., sec. spec. typ. (♀♀).

13. *Criocoris sulcicornis* (Kbm., 1856) = *Cr. ater* Jak., 1882, syn. nov., sec. spec. typ. (♀) = *Psallus albipes* (Jak., 1877), syn. nov., sec. spec. typ. (♂) = *P. albipesinus* Carv., 1958 (nom. nov. pro *P. albipes* Jak. nec Fieb.), syn. nov.

14. *Atractotomimus picturatus* Kir., 1952, sec. spec. typ. = *Aphaenophyes crassicornis* E. Wagn., 1960, syn. nov. Типы *A. crassicornis* являются частью серии из Термеза, собранной А. Н. Кириченко, они были посланы в свое время на определение О. М. Рейтеру. Другая часть этой же серии осталась в Ленинграде и послужила паратипами при описании *A. picturatus* Kir. Поскольку мне недоступен материал по типу рода *Aphaenophyes* — *A. laticeps* Reut., 1899, я не могу решить вопрос о взаимоотношениях родов *Aphaenophyes* Reut., 1899 и *Atractotomimus* Kir., 1952.

ЛИТЕРАТУРА

- Кириченко А. Н., 1918. Полужесткокрылые (Hemiptera, Heteroptera) Кавказского края, 1. Зап. Кавказск. муз., сер. А, 6 : 1—177.
Кириченко А. Н., 1951а. Настоящие полужесткокрылые и цикадовые. Сб. «Ущелье Кондара» : 181—197.
Кириченко А. Н. 1951б. Настоящие полужесткокрылые (Hemiptera—Heteroptera) европейской части СССР. Изд. АН СССР.