

Dolichomiris Reut.**D. linearis** Reut.

Dolichomiris linearis Reut. Öfv. F. Vet. Förh. 25 (1882): 29. — China 1938: 32.
— Lindb. 1953: 121. — 1958: 100.

Madeira: Ribeira; Serra de Agua, 16–19. VII. 1957, 1 Ex.; Terreira da Luta, 21. VII. 1957, 4 Exx.

Kanarische und Kapverdische Inseln, Südfrankreich, Westafrika; Venezuela. Über die wahrscheinliche Verbreitungsgeschichte von *Dolichomiris linearis* habe ich mich früher (1958) geäußert (Vgl. ferner oben S. 14).

Monalocoris Dahlb.**M. parvulus** (Reut.)

Corytoproctis parvulus Reut. Berlin. Ent. Zeit. (1881): 158. — *Monalocoris p.* China 1938: 33.

Madeira: Rabagal, 22 Exx. (Lu), 5–7. V. 1959, 4 Exx.; De Loros pr Encumeada, 21. IV. 1959, 5 Exx.; Caramujo, 1 Ex. (Lu); Serra de Agua, 16–19. VII. 1959, 22 Exx.; Queimadas, 24–26. VI. 1957, 7 Exx., 14–16. 1959, 3 Exx. (P), 15 Exx.; Pico Ruivo, 27–29. VI. 1957, 16 Exx.; Ribeira do Inferno, 2 Exx. (Lu); Feiteiras, 1 Ex. (Lu); Ribeira Frio, 2 Exx. (Frey, Stora), 14. V. 1959, 2 Exx. (P), 3 Exx.; St. Ana, 2 Exx. (Exp. Danica Galateae 1884, nach CHINA).

Auf *Hesperis aquatica* auf höheren Lagen der Insel Madeira. Besonders in Waldgebieten auf der Nordseite der Insel, allerdings nicht im Kulturbereich. Endemisch. Auf den Azoren kommt die Form *atlantica* Lindb. von der gewöhnlichen euro-sibirischen Art *Monalocoris filicis* L. vor.

Macrolophus Fieb.**M. nebula** (H. S.)

Cypris nebula H. S. Faun. Germ. 135, 9 (1835). — *Macrolophus n.* China: 1938: 34.

Madeira: 4 Exx. (coll. Wollaston); Serra de Agua, 2. VII. 1957, 1 Ex.; Funchal, 9–10. VI. 1957, 20 Exx.

CHINA betrachtet *Macrolophus nebula* als eine mediterrane Art, die sich in Mitteleuropa (und bis zu dem südlichen Teil von Nordeuropa) verbreitet hat. Von den Kanarischen Inseln ist die Art *M. caliginosus* E. Wagn., von den Azoren *M. costalis* Fieb. angeführt.

Cyrtopeltis geniculata Fieb. (Bur. Hem. (1961): 323). NOUALHIER war unsicher bezüglich der Bestimmung, als er diese Art von Madeira anmeldete (1897). Auch betrifft des Vorkommen der Art auf den Kanaren (angemeldet von PUTON, Rev. d'Ent. VIII, 1889: 29) handelt es sich wahrscheinlich um die folgende Art, hinsichtlich der Kanarischen Inseln um *Cyrtopeltis canariensis* Lindb. (siehe LINDBERG 1953).

Nesidiocoris Kirk.**N. tenuis** (Reut.)

Cyrtopeltis tenuis Reut. Rev. d'Ent. XIV (1895): 139. — *Engystatus tenuis* China 1938: 34. — Lindb. 1953: 124. — *Nesidiocoris t.* Lindb. 1958: 101.

Madeira: (leg. Schmitz, in Mus. Hels. Typen N:o 3469, 3470); Formosa pr Funchal, 28. IV. 1958, 5 Exx.; Monte, 1 Ex. (Frey); Garajão, 4. IV. 1959, 1 Ex.