

- 7 (6). Голова, переднеспинка и щиток у самцов чаще сплошь черные, а у самок желтые с черными пятнами или полосами, чешуйки на теле золотистые. Клавус у обоих полов черный. Темя в 1.8—2.0 (самцы) или 2.1—2.3 (самки) раза шире глаза. Эдеагус сильно изогнут (рис. 10) *S. gobicus* sp. n.
- 8 (1). Тело сверху светлое, желтое или зеленовато-серое, с темными пятнами и полосами.




Рис. 7—11. *Sthenaropsis* spp. Эдеагус.
7 — *S. gracilicornis* Lv. (Туркмения); 8 — *S. obscurus* Popp. (Монголия); 9 — *S. variegatus* Popp. (Туркмения); 10 — *S. gobicus* sp. n. (Монголия); 11 — *S. piperatus* Popp. (Туркмения).

- 9 (10). Тело желтое, с крупными, черного цвета, парными пятнами на голове (рис. 1) и переднеспинке, но без пунктировки на надкрыльях. 2-й членник усиков явно тоньше передней голени, но едва толще 3-го членика. Темя в 1.6—2.1 (самцы) или 2.2—2.5 (самки) раза шире глаза. Эдеагус короткий (рис. 9) *S. variegatus* Popp.
- 10 (9). Тело зеленовато-серое, без крупных черных пятен, но с точками бурой пунктировки на надкрыльях. 2-й членник усиков немного толще передней голени и гораздо толще 3-го членика усиков. Темя в 1.7—1.9 (самцы) или 2.0—2.4 (самки) раза шире глаза. Эдеагус короткий и широкий (рис. 11) *S. piperatus* Linnv.

S. gracilicornis Linnv. (рис. 12). По материалам Зоологического института АН СССР известен из Туркмении (Мургаб), Узбекистана (Терmez, Наманган, Самарканд, Бухара, Хива), Таджикистана (Джиликуль на р. Вахш) и Казахстана (пески Малые Барсуки: уроч. Койлибай; ст. Жулек и Аккуль близ Сырдарьи); взрослые по-падались с серединой мая и до середины июля. Личинки отмечались нами в Моллакаре (Туркмения) с 3 V 1974, по учетам 7 VI 1974 вид был представлен там почти исключи-