

- ♂♂♀♀, auf Bergwiesen (1300 m) an gelbblühenden Compositen (*Chrysanthemum*) zahlreich.
- Adelphocoris bimaculicollis* LDBG, 1948, Marrasch 16.6.52, 1 ♂ - Sonstige Verbreitung: Cypern, Palästina.
- Alloeonotus fulvipes separandus* HORV. 1888, Akschehir 10.6.55, 1 ♂ 8 ♀♀ in der baumlosen Steppe um den Seerand des Akschehir-Gölü auf den Büschen von *Peganum harmala* L. (Rutaceae).
- Aphanosoma italicum* COSTA 1841, Akschehir 3.6.55, 36♂♂♀♀ an blaublühenden *Vicia*-Büschchen der Berghänge (Sultan-Dagh).
- Poecilonotus picturatus* REUT. 1896, Namrun (1200 m) im Mitteltaurus, 28.6.52, in der Ufer-Vegetation der Bergbäche auf Umbelliferen, 57 ♂♂♀♀.
- Brachycoleus lineellus* JAK. 1883, Ulukischla 21.5.55 1 ♀, Incesu 22.5.55 1 ♂ 3 ♀♀ an *Artemisia*. Auch bei Aleppo 29.5.52 4 ♀♀ an *Phlomis* gefunden. Lebt anscheinend an weissfilzig behaarten Kräutern. -
- Orthops conspurcatus* REUT. 1875, Marasch 19.6.52 auf *Tamarix* am Ufer des Aksu 1 ♂. — Sonstige Verbreitung: Pyrenäenhalbinsel, Canaren, Nord-Afrika.
- Orthops atomarius* (MEY. D.) 1843, Namrun 29.6.52, auf *Abies cilicica* 2 ♂♂ 4 ♀♀.
- Cyphodema cilicicum* SEID. 1954, Çiftahan 28.5.55 (Mitteltaurus) 10 ♂♂ 7 ♀♀ auf *Aethusa cynapium* L. an den Talhängen.
- Polymerus (Poeciloscytus) brevicornis* REUT. 1878, Ereğli 11.7.52 auf *Galium verum* L. an Strassenrändern 41 ♂♂♀♀. — Sonstige Verbreitung: Osteuropa, Kaukasien, Turkestan, Sibirien.
- Capsodes (Horistus) bimaculatus* JAK. 1883, im Mai und Juni 1955 immer zahlreich auf den Blütenständen von *Asphodelus* angetroffen bei Posanti, Çiftahan, Ulukischla und Kayseri.
- Camponotidea fieberi* REUT. 1879, Tarsus 23.4.55 zahlreich auf *Salvia horminum* L. im Kulturbereich an Wegen, Bahndämmen, Wiesenrändern. Vom 1. - 15.6.55 bei Akschehir auf *Vicia* 48 ♂♂♀♀. Vielfach aus der Krautvegetation gestreift, aber niemals zusammen mit Ameisen.
- Platyporus dorsalis* REUT. 1890, Ulukischla 21.5.55, Posanti 15.5.55, zahlreich auf kurzrasigen Trockenwiesen zwischen *Alyssum calycinum* L.
- Euryopicoris nitidus* (Mey. D.) 1843, Posanti im Mitteltaurus 15.5.55, auf Berglichtungen in 2000m Höhe 6 ♀♀. — Sonstige Verbreitung: Europa, Kaukasus, Sibirien.
- Orthocephalus parvulus* REUT. 1891, Posanti 9.5.55 in Mengen an blühendem *Lotus* L.
- Halticidea punctulata* REUT. 1901, aus Ulukischla (22.5.55, 2 ♂♂), habe ich schon im ersten Teil (Heteroptera aus Anatolien I) angeführt. Bisher ist nur das ♀ bekannt gewesen, das aus dem Ural stammte. Ich füge deshalb eine Beschreibung des ♂ an (Fig. 1-4):
- Körper breit oval, 1,9x so lang wie breit, schwarz, glänzend, kahl. Kopf unterhalb der Fühlergrube mit gelbbraunem Keilstrich entlang der Gena-Lorum-Grenze; Rostrum schwarzbraun, erreicht die Hintercoxen. Orificien gelblichweiss, Schenkelspitzen und Tibien mit Ausnahme der Distalenden gelbbraun.