

M. flicis atlanticus Lindb. e si differenziano da quelli solo per la peluria leggermente più lunga.

DISTRIBUZIONE GENERALE: eurosiberica.

Subfam. Deraeocorinae Douglas & Scott

Deraeocoris (Deraeocoris) flavilinea (Costa), 1860
Wagner, 1970: 38

CAL.: Camigliatello, VII.38, es. 3 (l. Burlini) e VII.76, es. 1 (l. c. Angelini); Spezzano Piccolo, VIII.60, es. 6 (det. Wagner).

È noto della Sicilia, Puglie, Campania e Liguria.

DISTRIBUZIONE GENERALE: tirrenica.

Deraeocoris (Deraeocoris) morio (Boheman), 1832
Wagner, 1970: 41

BAS.: Monte Pollino, Vallone Malvento m 1600, VI.1977, es. 1, assegnabile alla f. *ossiannilssoni* Wagn. (l. Angelini).

È stato raccolto solo in Trentino, Lombardia e Piemonte ed è la cattura più meridionale di questo elemento boreo-montano. È noto di Svezia, Inghilterra, Francia, Svizzera e Jugoslavia settentrionale.

DISTRIBUZIONE GENERALE: europea.

Deraeocoris (Deraeocoris) olivaceus
(Fabricius), 1776
Wagner, 1970: 36

BAS.: Gallipoli, Foresta Demaniale, VI.72, es. 1 (l. Chemini).

È stato raccolto in Sicilia (Madonie, m 1700 s.m. su *Pirus*), nel Molise (Matese), in Emilia (M. Fiumalbo su *Crataegus*), Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino e Alto Adige; SERVADEI: 39, lo ha raccolto in Campania. È una specie montana, in modo particolare nelle regioni appenniniche e in Sicilia.

DISTRIBUZIONE GENERALE: euromagrebina (esclusa la Penisola Iberica e l'Europa orientale).

Deraeocoris (Deraeocoris) punctum
(Rambur), 1842 (fig. 12 A)
Wagner, 1970: 42

CAL.: Nucarelle, VII.57, es. 1; Gambarie e Bagaladi, VII.57, es. 18 su *Scolymus hispanicus* L.; S. Eufemia A., VI.58, es. 1; Podargoni e Delia Nova, VI.58, es. 3; Mongiana, M. Pecoraro, VI.60, es. 2; Camigliatello, VII.76, es. 1 (l. c. Angelini).

Fra questo materiale vi sono esemplari appartenenti alla forma tipica, alla f. *corrusca* Garb. e alla f. *nigerrima* Puton.

Ho visto materiale di Malta, Sicilia, Puglie, Campania e Sardegna; ritengo necessitano di confermare le citazioni per il Lazio e l'Abruzzo.

DISTRIBUZIONE GENERALE: atlantico-nordmediterranea e magrebina.

Deraeocoris (Deraeocoris) ruber (Linnaeus), 1758
Wagner, 1970: 44

BAS.: Lauria, VI.50, es. 2 (l. c. Castellani); Policoro, V.57, es. 1. CAL.: Taverna, VIII.60, es. 2; Longobardi, VIII.61, es. 2; Camigliatello, VII.76, es. 1 (l. c. Angelini). Sono compresi esemplari della forma tipica e f. *scopolii* Stichel.

È frequente in tutte le nostre regioni, al Nord più che al Sud, su piante e erbe con Psillidi, Afidi o acari dei quali si ciba (Viggiani, 1971).

DISTRIBUZIONE GENERALE: euromagrebina, nota anche degli U.S.A.

Deraeocoris (Deraeocoris) schach (Fabricius), 1781
Wagner, 1970: 43

BAS.: Lauria, VII.51, es. 7. CAL.: Mass. Pollino: Colloredo, Santicelli e Mazzicanino, VI.51 e VII.53, es. 25; Melito P. S. su *Spartium junceum* L., V.57, es. 12 (l. Conci, c. MM); S. Eufemia A., VII.57, es. 1; Delianuova e Reggio dintorni, VI.58, es. 30 su *Erica arborea* L. e *Cistus* sp.; Gambarie, Bagaladi e Nucarelle, VI e VII.57, es. 13 su *Spartium*; Chiaravalle, VI, VII.60, es. 3; Paola dint., VII.76, es. 1 (l. c. Angelini). Con la forma tipica sono state raccolte: f. *cunealis* Reut., f. *novaki* Horv., f. *reuteri* Stichel, f. *rufipennis* Reut. e f. *subrutila* Horv.

È stato segnalato in quasi tutte le nostre regioni appenniniche (SERVADEI: 43) (manca la Liguria) e dobbiamo aggiungervi la Sicilia, le Eolie, Ponza, Ischia, Giglio e il Veneto; manca in tutte le regioni alpine.

DISTRIBUZIONE GENERALE: nordmediterraneo-magrebina.

Deraeocoris (Camptobrochis) serenus
Douglas & Scott, 1868
Wagner, 1970: 45

BAS.: Lauria, VII.51, es. 2 (l. c. Castellani); Mass. Pollino, Piani di Ruggio e Piani di Vaquarro,