

Phytocoris (Ktenocoris) flammula Reuter, 1875
Wagner, 1970: 223

BAS.: Policoro, VI.58, es. 1 (l. c. Servadei). CAL.: Melito P. S., v.57, es. 1; S. Cristina d'Aspromonte, Bagaladi e Podargoni, VI.58, es. 5 su *Helichrysum italicum* Guss.; Delianuova, VI.58, es. 13 su *Helichrysum italicum* Guss.

È stato raccolto in Alto Adige, Trentino, Piemonte, Marche, Umbria, Abruzzo, Puglia e Sicilia (l. c. Carapezza).

DISTRIBUZIONE GENERALE: sudeuropea-occidentale.

Phytocoris (Ktenocoris) italicus Wagner, 1954
Wagner, 1970: 223

BAS.: Lauria, VII.51, es. 1 (l. c. Castellani). È citato anche in SERVADEI: 155.

Ho visto esemplari dell'Alto Adige, Trentino, Marche, Liguria e Isola di Montecristo tutti raccolti su *Artemisia campestris* L.

DISTRIBUZIONE GENERALE: alpino-appenninica.

Phytocoris (Ktenocoris) jordani Wagner, 1955
Wagner, 1970: 229

CAL.: Papisidero, Piano Laria, m 500, VIII.73, es. 1 su *Sarothamnus*.

Ho esaminato esemplari del *jordani* della Sardegna (M.te Ferru su *Genista asphalathoides* Lam.); del Veneto (S. Ambrogio su *Teucrium*) e delle Alpi Marittime francesi (Colle di Tenda su *Genista*).

DISTRIBUZIONE GENERALE: sudeuropea-occidentale.

Phytocoris (Ktenocoris) varipes Boheman, 1852
Wagner, 1970: 231

BAS.: Monticchio, VIII.54, es. 1 (l. c. Servadei). CAL.: Aprigliano, Taverna e Spezzano Piccolo, VIII.60, es. 11 su *Galium*; Grotteria e Paola, VIII.61, es. 2; S. Fili, VIII.62, es. 2; Capo Trionto, IX.62, es. 1; Passo Campotenese, IX.73, es. 1.

Ho visto esemplari di questa specie raccolti in quelle regioni che non sono citate in SERVADEI: 157, così che possiamo asserire che il *varipes* c'è in tutta l'Italia.

DISTRIBUZIONE GENERALE: euroturanico-magrebina.

Phytocoris (Ktenocoris) vittiger Reuter, 1896
Wagner, 1970: 216

BAS.: Lagonegro, VII.57, es. 2 femmine (l. c. Servadei).

In SERVADEI: 157, è ricordata la cattura di questa specie rara anche in Piemonte.

DISTRIBUZIONE GENERALE: sudeuropea-occidentale.

Phytocoris (Ktenocoris) weidneri Wagner, 1975
(= *P. gnidius* Tamanini, 1975)
Wagner, 1975: 291; Tamanini, 1975: 152.

CAL.: Melito P. S., v.57, es. 1 su *Daphne gnidium* L.; S. Eufemia A., VII.57, es. 1 su *Daphne*; Bagaladi, VII.57, es. 1 su *Verbascum thapsus* L.

Le due descrizioni di questa entità sono state pubblicate nel dicembre 1975 a pochi giorni di distanza l'una dall'altra. Gli esemplari tipici del *weidneri* sono stati raccolti dal prof. Servadei nell'isola di Panarea (I. Eolie). I tipici del *gnidius*, oltre che in Calabria, sono stati catturati anche in Sicilia (Messina, Madonie, Grateri). Una terza descrizione di questa specie venne pubblicata da Seidenstucker nel 1976 come *P. milvus* sp. n. su esemplari della Turchia.

DISTRIBUZIONE GENERALE: nordmediterranea-orientale.

Phytocoris (Eckerleinus) obliquus Costa, 1852
Wagner, 1970: 238

BAS.: Montalbano Ionico, Andriace, VI.58, es. 2 (l. c. Servadei). CAL.: Delianuova, S. Cristina d'Aspromonte, VI.58, es. 7 su *Helichrysum italicum* Guss.; Acri e S. Eufemia Lamezia, VIII.60, es. 13 su *Artemisia campestris* L.; Belsito, VIII.62, es. 12 su *Artemisia*; Sibari, IX.62, es. 1

Alle regioni indicate in SERVADEI: 156, si possono aggiungere l'Alto Adige e l'Abruzzo.

DISTRIBUZIONE GENERALE: sudeuropea-occidentale.

Adelphocoris lineolatus (Goeze), 1778
Wagner, 1970: 292

BAS.: Frusci, a m 1000 s.m., VI.49, es. 1 (l. c. Castellani); Nova Siri e Policoro, VII.72, es. 3 (l. Osella). CAL.: ritengo uno spreco di spazio riportare qui tutte le località nelle quali venne raccolto (dal maggio al settembre) questo comunissimo miride. Nei campi di medica e di trifoglio