

Platycranus	Capo			Antenne					Pronoto		Lunghezza del corpo
	Larghezza	Fronte	Rapp. fr.: occhi	I. art.	Rapp. I a.: fronte	Rapp. I a.: capo	II. art.	Rapp. II a.: pron.	Larghezza	Rapp. pron.: capo	
♂ minore	1,13	0,49	1,53	0,77	1,57	0,68	2,15	2,03	1,05	0,92	5,17
♂ maggiore	1,21	0,51	1,44	0,82	1,61	0,67	2,44	2,08	1,17	0,96	6,20
♀ minore	1,17	0,66	2,61	0,86	1,29	0,73	2,27	2,11	1,07	0,91	5,48
♀ maggiore	1,28	0,67	2,37	0,98	1,40	0,76	2,66	2,06	1,29	0,99	6,27

TAB. II: Dimensioni estreme in mm e rapporti fra le varie grandezze del *Platycranus erberi* dell'Italia meridionale.

soleggiati dell'Italia meridionale, appartiene a una sola entità, che determino come *P. erberi* Fb. È possibile che su una stessa pianta, comune e molto diffusa convivano contemporaneamente due entità strettamente vicine? Non intendo per ora proporre la sinonimia di *erberi* e *michalki* poiché di quest'ultimo ho visto solo pochi esemplari delle località tipiche.

Reuteria marqueti Puton, 1875
(= *R. irrorata* auct.)
Wagner, 1973: 162

CAL.: Domanico, M. Scudiero, m 1200 e Celico, Fago del Soldato, m 1400, VIII.62, es. 11 su *Quercus cerris* L.

Alle regioni italiane nelle quali è stata raccolta la specie secondo SERVADEI: 117, possiamo aggiungere: Piemonte (l. Capra, su *Quercus* sp.), Marche (su *Quercus cerris* L.), Umbria (su *Quercus petraea* Liebl.), Puglia (su *Quercus pubescens* Willd.).

DISTRIBUZIONE GENERALE: medio-sudeuropea.

Pseudoloxops coccinea (Meyer-Dür), 1843
Wagner, 1973: 167

BAS.: La prima segnalazione di questa specie in Basilicata è in SERVADEI: 124.

Questa cattura è anche la prima per l'Italia, la seconda è di Carapezza in Sicilia (Madonie, VI.77).

DISTRIBUZIONE GENERALE: medio-sudeuropea macaronese.

Pachylops prasinus (Fieber), 1861
Wagner, 1973: 170

BAS.: Nova Siri, v.67, es. 10 su *Daphne gnidium* L.

Finora si conosce solo delle poche regioni che ci indica SERVADEI: 117.

DISTRIBUZIONE GENERALE: nordmediterraneo-occidentale, magrebina.

Orthotylus (Orthotylus) obscurus, Reuter, 1875
Wagner, 1973: 185

CAL.: Aspromonte, Monte Montalto, m 1900, VII.79, es. 1 su *Abies alba* Miller (l. c. Carapezza).

Elemento montano nuovo per l'Italia.

DISTRIBUZIONE GENERALE: sudeuropea (Francia mer., Germania mer., Jugoslavia, Bulgaria e Romania).

Orthotylus (Orthotylus) marginalis Reuter, 1884
Wagner, 1973: 189

BAS.: Montalbano I., v.57, es. 2 su *Salix herbacea* L. CAL.: Mass. Pollino: Gaudolino e Santicelli, VII.50 e VI.51 es. 8 (l. La Greca); Spezzano Piccolo, VIII.60, es. 1 su *Salix cinerea*; Camigliatello, m 1450 s.m., VII.76, es. 2 (l. c. Angelini).

La raccolta di questa specie nelle regioni italiane è indicata in SERVADEI: 122; possiamo aggiungere la Lombardia e la Sicilia. È stata osservata con maggiore frequenza su *Salix aurita* L., *Salix cinerea* L. e *Alnus viridis* Dc.

DISTRIBUZIONE GENERALE: eurosibirica magrebina.

Orthotylus (Neopachylops) concolor
(Kirschbaum, 1856) (fig. 24A)
Wagner, 1973: 213

BAS.: Lagonegro, VII.57, es. 5 (l. c. Servadei).

Ho visto esemplari di questa entità della Campania, raccolti su *Sarothamnus scoparius* L. (la citazione del *concolor* per il Trentino, in Tamani, 1961, è errata). In SERVADEI: 118, è citato per il Veneto e la Toscana.