

Trentino (su *Salvia pratensis* L.), Veneto, Abruzzo (l. c. Dioli) e Campania.

DISTRIBUZIONE GENERALE: europea.

*Mimocoris rugicollis* (Costa), 1852 (fig. 23B)

Wagner, 1973: 344

BAS.: Vulture, VIII.54, es. 1 (l. c. Servadei). CAL.: Gambarie, VII.57, es. 1 su *Fagus sylvatica* L.; Serra S. Bruno, VIII.61, es. 6 su *Alnus cordata* Loisel.; Ferdinandea, VIII.61, es. 1 su *Erica arborea* L.; Grimaldi, VIII.61, es. 3 su *Pirus amygdaliformis* Vill.; Domanico e Lago Triglia, VIII.62, es. 4 su detto.

Dall'esame di materiale di altre collezioni è emerso che il *rugicollis* è stato talvolta determinato come *M. coarctatus* M. R., errore facile. Questo fatto pone in dubbio la distribuzione dedotta dalla letteratura che ci dà SERVADEI. Personalmente ho visto dei *rugicollis* del Trentino, Emilia, Marche, Umbria, Calabria e Sicilia, catturati su piante di famiglie diverse, essendo i *Mimocoris* più zoofagi che fitofagi.

DISTRIBUZIONE GENERALE: nordmediterraneo-magrebina.

*Halldapus montandoni* Reuter, 1895

Wagner, 1973: 354

BAS.: Lagonegro, M. Sirino a m 1850, VIII.73, es. 1 su Graminacee. CAL.: Spezzano Piccolo, Monte Botte Donato a m 1900, VIII.60, es. 1 su Graminacee.

Ho esaminato esemplari di questa specie montana raccolti in Piemonte, Lombardia, Marche, Sicilia (leg. Carapezza) e nelle due regioni citate sopra.

DISTRIBUZIONE GENERALE: sudeuropea-turanica.

Subfam. Phylinae Douglas e Scott

*Macrotylus (Macrotylus) herrichi* (Reuter, 1873)

Wagner, 1973: 381

BAS.: Irsina, Bosco di Montechiano, VI.58, es. 4 (l. c. Servadei). CAL.: Isola di Capo Rizzuto, VI.59, es. 1 (l. c. Servadei).

La specie non è molto diffusa e alle regioni indicate in SERVADEI: 49, possiamo aggiungere: Alto Adige, Trentino (raccolta su *Salvia pratensis pratensis* L.), Emilia e Umbria (su *S. pratensis haematodes* Briq.).

DISTRIBUZIONE GENERALE: medio-sudeuropea orientale.

*Macrotylus (Alloeonycha) atricapillus* (Scott), 1782

Wagner, 1973: 394

CAL.: Delianuova, VI.58, es. 16 su *Cupularia viscosa* (L.); Gizzeria, Lago La Vota, VIII.60, es. 2 su detto.

È diffuso pressoché in tutte le nostre regioni, come esposto in SERVADEI: 49; personalmente ho constatato la sua presenza, sulla *Cupularia viscosa*, anche nelle Marche, Liguria, Toscana, Umbria, Calabria e Sicilia.

DISTRIBUZIONE GENERALE: nordmediterranea-centrale.

*Macrotylus (Alloeonycha) bipunctatus*

Reuter, 1879 (fig. 24C)

Wagner, 1973: 396

CAL.: Melito Porto Salvo, v.57, es. 12 su *Thymus capitatus* Hoffm. Fino ad ora questa specie per l'Italia è nota solo della Calabria.

DISTRIBUZIONE GENERALE: nordmediterraneo-macaronesica.

*Macrotylus (Alloeonycha) horvathi* Reuter, 1876

Wagner, 1973: 397

BAS.: Lauria, VII.57, es. 2 (l. c. Castellani) su *Rosmarinus officinalis* L.

In SERVADEI: 49, sono indicate diverse regioni nelle quali la specie è stata segnalata; personalmente la conosco (oltre che di Lauria) di Colfiorito (Umbria, su *Thymus*) e di Ravenna (Emilia, su *Ballota nigra* L.).

DISTRIBUZIONE GENERALE: medio-sudeuropea.

*Macrotylus (Alloeonycha) interpositus*

Wagner, 1951

Wagner, 1973: 394

BAS.: Nova Siri, v.57, es. 1 su *Cupularia viscosa* (L.). CAL.: Melito Porto Salvo, v.57, es. 9 su detto; S. Eufemia Aspr., VIII.60, es. 3 su detto; Acri, Ponte Crati, VIII.62, es. 12 su detto.

Ho visto esemplari di questa specie del Trentino, Liguria, Campania (su *Artemisia* sp.), Puglia e I. Eolie.

DISTRIBUZIONE GENERALE: sudeuropea.