

- Atomophora* spec. prope *vitticollis* Reut. Kerman: Anbar-Abad, 21. bis 30. IV. 1956, 1 ♂.
- Nov. genum prope *Atomophora*. Khuzistan: Shadegan, 24.-29. II. 1956, 1 ♂.
- Acrotelus caspicus* Reut. Khuzistan: Shadegan, 15.-23. II. 1956, 1 ♂. — Sonstige Verbreitung: Südrußland, Südeuropa bis ins Wiener Becken.
- Leucopteryx candidatum* Reut. Kerman: Anbar-Abad, 21.-30. IV. 1956, 1 ♂.
- Psallopsis basalis* Reut. Kerman: Anbar-Abad, 1.-18. V. 1956, 1 ♂, 2 ♀♀. — Sonstige Verbreitung: Bisher nur aus Persien bekannt.
- Psallopsis rufifemur* n. sp. Khuzistan: Shadegan, 1.-10. IV. 1956, 16 ♂♂, 3 ♀♀; 18 km nordöstlich Shadegan, Jarrahi-Ufergebiet, 28. III.-6. IV. 1956, 1 ♂. — Sonstige Verbreitung: Bisher nur aus Iran bekannt.
- Psallopsis similis* n. sp. Khuzistan: Shadegan, 26. III.-10. IV. 1956, 14 ♂♂, 9 ♀♀. — Sonstige Verbreitung: Bisher nur aus Iran bekannt.
- Malthacosoma halimocnemis* Beck. Kerman: Anbar-Abad, 21. IV.-18. V. 1956, 406 ♂♂, 320 ♀♀. — Sonstige Verbreitung: Ägypten, Syrien, Südrußland.
- var. *impunctata* nov. var. Kerman: Anbar-Abad, 21. IV.-18. V. 1956, 156 ♂♂, 68 ♀♀. — Sonstige Verbreitung: Bisher nur aus Iran bekannt.
- Plagiognathus bipunctatus* Reut. Kerman: Anbar-Abad, 21. IV.-18. V. 1956, 1 ♂, 4 ♀♀. — Sonstige Verbreitung: Vorderasien, Südrußland, Südeuropa bis Südfrankreich.
- Atomoscelis signaticornis* Reut. Kerman: Anbar-Abad, 21. IV.-18. V. 1956, 18 ♂♂, 20 ♀♀. — Sonstige Verbreitung: Ägypten.
- Atomoscelis onustus* Fieb. Kerman: Anbar-Abad, 21. IV.-18. V. 1956, 4 ♂♂, 5 ♀♀. — Sonstige Verbreitung: Vorderasien, Südeuropa bis Spanien.
- Atomoscelis tomentosus* Reut. Kerman: Anbar-Abad, 21.-30. IV. 1956, 1 ♂. — Sonstige Verbreitung: Bisher nur aus Ägypten bekannt.
- Campylomma diversicornis* Reut. Kerman: Anbar-Abad, 1.-18. V. 1956, 1 ♀. — Sonstige Verbreitung: Bisher nur aus Turkestan und Persien bekannt.
- Campylomma impicta* E. Wgn. Kerman: Anbar-Abad, 21. IV.-18. V. 1956, 4 ♂♂, 1 ♀. — Sonstige Verbreitung: Bisher nur aus Ägypten und Persien bekannt.
- Itupona dubia* E. Wgn. Kerman: Anbar-Abad, 21.-30. IV. 1956, 1 ♀; Belutschistan: Iranshar, 800 m, 1.-10. IV. 1954, 1 ♀. — Sonstige Verbreitung: Bisher nur aus Iran bekannt.
- Auchenocrepis alboscuteolata* Put. Kerman: Anbar-Abad, 21.-30. IV. 1956, 1 ♂, 1 ♀. — Sonstige Verbreitung: Vorderasien, Nordafrika bis Algerien.
- Tuponia carayoni* E. Wgn. Khuzistan: Shadegan, 1.-10. IV. 1956, 1 ♂; Kerman: Anbar-Abad, 21.-30. IV. 1956, 3 ♀♀. — Sonstige Verbreitung: Südeuropa bis Südfrankreich.
- Tuponia persica* E. Wgn. Kerman: Anbar-Abad, 21. IV.-18. V. 1956, 2 ♂♂, 5 ♀♀. — Sonstige Verbreitung: Bisher nur aus Iran bekannt.
- Tuponia tamaricicola* Lndbg. Kerman: Anbar-Abad, 21. IV.-18. V. 1956, 1 ♂, 3 ♀♀. — Sonstige Verbreitung: Ägypten (Sinai).
- Tuponia richteri* E. Wgn. Kerman: Anbar-Abad, 21. IV.-18. V. 1956, 4 ♂♂, 1 ♀. — Sonstige Verbreitung: Bisher nur aus Iran bekannt.
- Tuponia punctipes* Reut. Kerman: Anbar-Abad, 21. IV.-18. V. 1956, 2 ♂♂, 2 ♀♀. — Sonstige Verbreitung: Persien, Turkestan.