

Eduard WAGNER
(Hamburg)

Conostethus angustus sp. n. (Hemiptera Heteroptera, Miridae)

[Mit 1 Abbildung im Text]

Von auffallend schlanker, parallelseitiger Gestalt [Fig. a und b], das ♂ 4,5—4,6 mal, das ♀ 4,4—4,5 mal so lang wie das Pronotum hinten breit ist. Weisslichgrün bis hell ockergelb, das ♀ fast einfarbig, das ♂ teilweise grau bis schwarz. Matt, zerstreut mit sehr kurzen, hellen Haaren bedeckt, fast kahl. Glatt.

Kopf von oben gesehen [Fig. c und d] fast 2 mal so breit wie lang, beim ♀ deutlich etwas länger als beim ♂. Scheitel zwischen den Augen jederseits mit rundem, schwarzbraunem Fleck, der beim ♂ mit einer dunklen Zeichnung am Augenrande und am Hinterrande zusammenhängt. Scheitel beim ♂ 1,85 mal, beim ♀ 2,1 mal so breit wie das runde, braune Auge. Von vorn gesehen [Fig. e und f] ist der Kopf beim ♂ 1,15 mal, beim ♀ 1,2 mal so breit wie hoch. Tylus dick, gekrümmt, von der Stirn durch eine tiefe Furche getrennt. Stirn über dem Tylus gewölbt, stumpfkegelig. Fühlerwurzel etwas unterhalb der unteren Augenecke gelegen und den Augenrand berührend. Fühler bei ♂ und ♀ verschieden [Fig. g und h], beim ♂ schwarz mit feinen hellen Haaren, die in der basalen Hälfte des 3. Gliedes unterseits lang sind und dicht stehen. 1. Glied dick, etwas kürzer als der Scheitel breit ist; 2. Glied zylindrisch, 1,23 mal so lang wie der Kopf samt Augen breit ist, gerade; 3. Glied leicht gekrümmt, etwas dünner als das 2. und 1,2 mal so lang wie dieses und fast 1,4 mal so lang wie das Pronotum breit ist; das 4. Glied etwa halb so lang wie das 3., spindelförmig. Beim ♀ [Fig. h] sind die Fühler gelbgrün bis gelbbraun, wesentlich dünner und kürzer als beim ♂, haben aber die gleiche Behaarung. 1. Glied dick, nur 0,75 mal so lang wie der Scheitel breit ist; 2. Glied zylindrisch, 0,9 mal so lang wie der Kopf samt Augen breit ist, gerade; 3. Glied von gleicher Länge