

Material: 5 ♂♂ aus Sahara Espanol (Oued Agonidei) 6. 5. 42 1 ♂ (Morales leg.) und aus Algerien (Biskra) 28.—30. 4. 64 3 ♂♂ (Eckerlein leg.); Umgeb. Abadia 15. 4. 66. 1 ♂ (Eckerlein leg.).

Holotypus (Biskra) und Paratypoiden in meiner Sammlung; Paratypoiden auch in der Sammlung H. Eckerlein, Coburg.

Schlüssel für die Arten von *Compsognannus* Reut.

- 1 (4) 2. Fühlerglied mit dunklen oder roten Punkten oder Doppelpunkten, so lang oder fast so lang wie die Pronotumbreite.
- 2 (3) Rötlich oder rotgefleckt. 2. Fühlerglied beim ♂ 0.95 ×, beim ♀ 0.88 × so lang wie die Pronotumbreite. Hinterrand des Pronotum und Vorderkante der Hinterschenkel breit rot oder braun. 1. *C. puncticornis* Reut.
- 3 (2) Weißlichgelb, ohne rote Zeichnung. 2. Fühlerglied beim ♂ so lang wie die Pronotumbreite. Hinterrand des Pronotum und Vorderkante der Hinterschenkel hell, gleichfarben. 2. *C. longicornis* nov.spec.
- 4 (1) 2. Fühlerglied mit 3 schwarzen Ringen, nur wenig länger als die Kopfbreite. 3. *C. antennalis* Lindbg.

Literatur

- WAGNER, E. 1965: Die Gattung *Atomoscelis* Reut. und ihre Verwandten. — *Notulae Entomol.* 45:87—88.
 — 1968: Über einige Miriden aus Marokko. — *Notulae Entomol.* 48:109—110.