

Marawa 22. 4. 65 1 ♀, Ras Hilal 23. 4. 65 1 ♂, Jebel Akhdar Messa 25. 4. 65 1 ♀, Trip: Jebel Nefoussa Tarhuna 28. 4. 65 3 ♀♀, Jebel Nefoussa Garian 29. 4. 65 3 ♂♂, 4 ♀♀, 20 km südl. Azizia 29. 4. 65 3 ♂♂, 2 ♀♀ zusammen mit *A. crassicornis* E. Wgn. und einzelnen *A. vittiger* Reut. in der Artemisiasteppe, 20 km westl. Gasr-el-Garabulli 3. 5. 65 2 ♀♀. — Bisher nur aus Algerien und Libyen.
vittiger Reut., 1900: Trip: Jebel Nefoussa Bir Niggi 28. 4. 65 10 ♂♂ (Lichtanflug), 20 km westl. Gasr-el-Garabulli 3. 5. 65 35 ♂♂, 52 ♀♀. In der Cyrenaica und in Tripolitanien in sehr großen Mengen in lockeren Grasbeständen, die überwiegend von *Vulpiella stipoides* Maire, *Stipa retorta* Cav., *Bromus rubens* L. und *Koeleria pubesceus* P. B. gebildet werden. Lit: Linnavuori (1965) zitiert den Fund Eckerleins von Zuara. — Algerien, Tunesien.

Macrotylus Fieber, 1858

nasutus E. Wgn., 1958: Trip: Zuara 29. 4. 61 1 ♀, 20 km westl. Gasr-el-Garabulli 3. 5. 65 mehrere Exemplare. — Marokko, Algerien.

Tytthus Fieber, 1864

parviceps (Reut.), 1890: Lit: Cyr: El Merj 30. 8. 62 (Linnavuori 1965) Lichtfang. — Nordafrika, Arabien, äthiopische Region.

Ectagela Karl Schmidt, 1939

punctata nov. spec. (E. Wgn.) Fezz: 20 km südl. Socna 15. 4. 65 25 ♂♂, 23 ♀♀ an *Maerua crassifolia* Forsk. — Bisher nur aus Fezzan.

Psallus Fieber, 1858, subgen *Psallus* s. str.

varians (H.-S.), 1841 subspec. *tunetanus* (E. Wgn.), 1962: Cyr: Wadi el Kuf 2. 5. 63 zahlreich an blühenden *Quercus coccifera* L.-Bäumen, 10 km El Merj 22. 4. 65 nur 7 ♀♀ und 1 ♂, da in diesem Jahr die Bäume schon Eicheln angesetzt hatten. Lit: Linnavuori (1965) zitiert die Funde Eckerleins vom Wadi el Kuf und Gubba. — Bisher nur aus Tunesien.

aurora (Mls.), 1852: Lit: Cyr: Benghazi 30. 8. 62 (Linnavuori 1965) — Südfrankreich, Pyrenäen-Halbinsel, Algerien.

Compsidolon Reuter, 1899

balachowskyi E. Wgn., 1958: Trip: Leptis Magna 4. 5. 63 1 ♂, Tarhuna 4. 5. 63 1 ♂, Jebel Nefoussa Bir Niggi 28. 4. 65 37 ♂♂ (Lichtanflug), 20 km südl. Azzizia 29. 4. 65 sehr häufig an *Artemisia herba-alba* Asso zusammen mit *Phytocoris libycus* E. Wgn. und *Plagiognathus herbaalbae* E. Wgn. Lit: Linnavuori (1965) zitiert den Fund Eckerleins von Tarhuna unter dem Namen *Psallus scutellaris* Reut. — Als der südlichen Sahara und aus Algerien.

adpersum (K. Schm.), 1939: Trip: Bu-Ngem 15. 4. 65 1 ♀, 60 km östl. Nalut 30. 4. 65 1 ♂. — Bisher nur aus Ägypten.

saunderi (Reut.), 1901: Trip: Zuara 29. 4. 61 1 ♀, 10 km südl. Tripolis 30. 4. 61 1 ♀. Lit: (Linnavuori 1965) zitiert den Fund Eckerleins von Tarhuna. — Algerien.

pseudocrotchi nov. spec. (E. Wgn.): Cyr: Jebel Akhdar Marawa 22. 4. 65 8 ♂♂, 22 ♀♀ an *Artemisia herbaalba* Asso. — Bisher nur aus der Cyrenaica.