

verticata E. Wgn., 1961: Fezz: 20 km südl. Socna 15. 4. 65 2 ♂♂, 5 ♀♀ — Die Art wurde aus Ägypten beschrieben und ist anscheinend im Nordafrika weiter verbreitet.

Maurodactylus Reuter, 1878

alutaceus (Fieb.), 1870: Trip: Kseia 3. 5. 61 12 ♂♂, 13 ♀♀, Leptis Magna 4. 5. 63 4 ♂♂, 5 ♀♀. Lit: Linnavuori (1965) zitiert die Funde Eckerleins von Jebel Nefoussa und Tarhuna. Mediterrane Art, fehlt in Südeuropa.

nigrigenis (Reut.), 1890: Trip: Jebel Nefoussa Bir Niggi 28. 4. 65 4 ♂♂ (Lichtanflug), 20 km westl. Gasr-el-Garabulli 3. 5. 65 1 ♂, 1 ♀ — Nordafrika, Vorderasien, Transkaspien (saharo-sindisch?)

Auchenocrepis Fieber, 1858

alboscutellata Put., 1874: Fezz: Uaddan 15. 4. 65 18 ♂♂, 5 ♀♀ an Casuarina equisetifolia Forst., Fokha 16. 4. 65 1 ♀, Sebha Ain Krim 17. 4. 65 5 ♂♂, 9 ♀♀; Trip: 20 km westl. Gasr-el-Garabulli 3. 5. 65 3 ♂♂, 4 ♀♀. Lit: Cyr: Kufra (Mancini 1940); Trip: Zuara-Tripoli 27. 8. 62 (Linnavuori 1965); Cyr: Giarabub (de Bergevin 1930 1930), Augila, Gialo (de Bergevin 1932, Zavattari 1934) Siwa/Ägypten (Hoberlandt 1953) — Nordafrika, Vorderasien bis Belutschistan. Saharo-sindisch.

Aphaenophyes Reuter, 1899

laticeps Reut., 1899: Cyr: Serti 3. 5. 63, Zelten 28. 4. 65, in großen Mengen an Limoniastrum guyonianum Dur. et Bois. — Von Ägypten bis Algerien verbreitet. Eremisch.

richteri (E. Wgn.), 1957: Trip: Zuara 29. 4. 61 2 ♀♀; Fezz: Fokha 16. 4. 65 zahlreich an Casuarina equisetifolia Forsk., Uaddan 15. 4. 65 18 ♂♂, 11 ♀♀, Sebha Ain Krim 17. 4. 65 zahlreich, Rhoddua 17. 4. 65 2 ♂♂, 4 ♀♀; Trip: 20 km westl. Gasr-el-Garabulli 3. 5. 65 5 ♂♂, 9 ♀♀. Lit: Trip: Homs 28. 8. 62, Zuara-Tripoli 27. 8. 62 (Linnavuori 1965), unter dem Namen *Tuponia richteri* E. Wgn. angeführt — Nordafrika, Vorderasien bis Belutschistan. Saharo-sindisch.

Tuponia Reuter 1878 subgen. *Tuponia* s. str.

tamaricicola Ldbg., 1939: Cyr: Oasis Giarabub 24. 4. 65 1 ♀. Lit: Trip: Zuara-Tripoli 27. 8. 62 (Linnavuori 1965) — Bisher aus Ägypten. Eremisch.
spec. ?prope *tamaricicola* Ldbg.: Trip: Gusbat 3. 5. 61 1 ♀. Vermutlich eine nov. spec.

lethierryi Reut., 1875: Fezz: Uaddan 15. 4. 65 häufig zusammen mit *T. mixticolor* Costa an Tamarix amplexicaulis Ehrenb.; Cyr: Benghazi 21. 4. 65 31 ♂♂, 42 ♀♀; Trip: 10 km westl. Gasr-el-Garabulli 3. 5. 65 1 ♂, 15 ♀♀. Lit: Cyr: Augila (de Bergevin 1932, Zavattari 1934) — Mediterran.

Hoberlandt (1953) meldet außerdem *T. pallida* Reut. und *T. elegans* Jak. aus der Oase Siwa/Ägypten und Zavattari (1934) *T. pallida* Reut. aus Cyr: Giarabub. Es ist unwahrscheinlich, daß diese beiden Arten dort vorkommen. Vermutlich handelt es sich dabei um die vorhergehende Art.

mixticolor (Costa), 1860: Fezz: Uaddan 15. 4. 65 1 ♀ an Tamarix amplexicaulis Ehrenb.; Trip: Leptis Magna 28. 4. 65 1 ♀ — Südeuropa, Nordafrika.