

Ueber einige amerikanische Capsiden.

Von Dr. E. Bergroth in Tammerfors.

1. *Stenodema instabilis* Uhl.

Die meisten neueren Autoren und Uhler selbst in seinen späteren Schriften nennen diese Art *St. (Miris) affinis* Reut. (1875), indem sie übersehen haben, dass die erste Beschreibung von *instabilis* bereits in Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1871, pag. 104 erschien. Auch der Name *vicinus* Prov. (1872) ist älter als *affinis*.

Caulotops n. gen.

Caput verticale, ab antico visum triangulare, a latere visum longitudine duplo altius, vertice sulco longitudinali destituto, postice immarginato, fronte transversim leviter convexa, utrinque supra scrobes antennarum ad orbitam anteriorem oculorum foveolato-impressa, clypeo a fronte impressione discreto, deplanato, vix prominulo, apicem versus non nisi levissime angustato, basi ejus longe infra oculos sita, genis praealtis, loris haud discretis, oculis parvis, subovalibus, ultra angulos apicales pronoti exsertis, breviter petiolatis, a supero visis orbita interna subrecta antrorsum convergentibus, antennis nonnihil intra et infra oculos atque extra et supra basin clypei insertis, articulo primo apicem clypei paulum superante. Pronotum transversum, basi quam apice circiter duplo latius, lateribus immarginatum, margine apicali leviter sinuato, margine basali leviter rotundato, medio truncato, disco nonnihil ante medium impressione transversa distincta in duos lobos diviso, lobo antico capite cum oculis angustiore, strictura apicali annuliformi depressa dense profundeque punctata ac pone hanc utrinque callo transverso laevi marginem lateralem attingente instructo, lobo postico capite latiore, nonnihil convexo, crebre et profunde punctato. Scutellum triangulare, impunctatum. Hemelytra apicem abdominis superantia, lateribus leviter rotundata, embolio angusto, reflexo, costa et vena subcostali parallelis, vena cubitali solum parte basali distincta, deinde evanescente, vena brachiali obsoleta, cuneo