

Iridopeplus nov. gen.

Corpus oblongum, lœve. Caput (fig. 1) nutans, fere usque ad oculos immersum, apice pronoti multo latius, ab antico visum subæque latum ac altum, vertice leviter declivi, immarginato, intra oculos utrinque oblique transversim impressò, areola scrobes antennarum ferente a fronte linea obtuse impressa disjuncta, fronte fortius convexo-declivi, clypeo prominente, e latere viso nonnihil retrorsum vergente, prope basin utrinque impressione oblonga prædicto, basi scrobibus antennarum opposita, a fronte impressione profunda discreto, loris parum convexis, angulo fasciali subacuto, bucculis distinctis, gula peristomio æque longa, medio constricta, e latere visa angulato-sinuata, dimidio ejus antico obliquo, dimidio postico horizontali, prolongatione horizontali e parte postica gulæ ficta supra medium clypei currente, oculis magnis, e latere visis oblique obovatis, genis oculis multo humilioribus, antennis ad oculos infra medium orbitæ anterioris sinuatæ insertis, articulo primo capiti subæquilongo, basin versus angustato, secundo primo duplo longiore et latitudine basali pronoti $1/5$ longiore, subfusiformiter incrassato, basin versus fortius et longius angustato quam apicem versus, articulo tertio primo paullo longiore, gracili, linearí (art. quartus deest), rostro apicem coxarum medianarum paullum superante, articulo primo a gula longius distante, medium xyphi prosterni attingente. Pronotum (fig. 2) basi quam apice $2\frac{1}{2}$ latius, capite $2/3$ latius, longitudine sua $1/4$ latius, strictura apicali instructum, callis una cum strictura apicali trientem apicalem pronoti occupantibus, carinula debili obtusa postice breviter continuata disjunctis, postice linea impressa arcuata denudata extus abbreviata terminatis, disco sat fortiter (45°) declivi, margine basali medio late levissime subsinuato, marginibus lateralibus levissime subrotundatis, angulis humeralibus obtusis, rotundatis. Scutellum pronoto æque longum, modice convexum, basi detecta, lateribus levissime rotundatis, disco sulco longitudinali medio antice et postice abbreviato instructo. Xyphus prosterni convexiusculus, tenuiter marginatus. Orificia distincta. Hemelytra apicem abdominis longius superantia, tota, cuneo coriaces excepto, hyalina, iridescentia, extus subparallela, clavo vena destituto, commissura scutello paullo breviore, margine costali corii paullo incrassato, vena cubitali debili sed distincta, a basi usque ad medium margini costali valde approximata, deinde ab hoc sensim divergente, cuneo leviter declivi, angusto, elongato, apicem abdominis et medium membranæ superante, latitudine sua basali plus quam triplo longiore, intus late fortius arcuato-sinuato, fractura leviter obliqua, incisura nulla, apice apici cellulæ majoris membranæ opposito, hac cellula apice