

muni prieditis. Scutellum cum mesoscuto late delecto quam pronotum haud multo brevius, mesoscuto a scutello proprio impressione sat profunda discreto et quam hoc haud multo breviore. Elytra apicem abdominis sat longe superantia, cellula exteriore membranae perangusta quam interiore multo breviore. Vagina feminae medium ventris superans. Pedes longiusculi et graciliusculi, tibiis linearibus, parce setosis, articulo primo tarsorum secundo subaeque longo. Long. ♀ 2.6, incl. tegm. 3.5 mill.

Luzon : Los Baños.

Readily distinguished from *T. fuscatus* POPP. by the longer antennæ, the structure of the rostrum and pronotum, and the different colour-markings.

Xenofulvius nov. gen.

Corpus impunctatum. Caput a supero visum triangulare, nonnihil brevius quam latius, pronoto brevius, apice pronoti latius, a latere visum anterius fortius convexo-declive, subaeque longum ac basi altum, vertice basi subtiliter marginato, clypeo a fronte vix discreto, oculis majusculis, sed altitudinem totam capitum vix occupantibus, gula brevissima, antennis paullo infra medium orbitæ anterioris oculorum insertis, articulo primo brevi, apicem clypei parum superante, crassiusculo, subclavato, secundo a basi ad apicem sensim sat fortiter incrassato, tertio secundo multo breviore, dimidio ejus apicali quam apice articuli secundi crassiore, quarto tertio fere aequo crasso, fusiformi, articulo primo rôstri basin capitum fere attingente. Pronotum leviter declive, paullo convexum, basi leviter rotundatum et mesoscutum oblegens, lateribus subrectis, vix sinuatis, immarginatis, collari perangusto, callis vix allevatis, parum distinctis. Scutellum parvum, planiscutellum, fore aequo longum ac latum. Elytra apicem abdominis paullulum superantia, corio et clavò venis destitutis, illo extus post medium leviter rotundato-ampliato, hoc magno, commissura scutello duplo longiore, embolio angustissimo, post medium cum corio confluente, cuncto horizontali, paullo longiore quam latiore, cellula exteriore membranae angusta, exteriore interiore subaeque longa, sed angustissima, ægre distinguenda. Vagina feminae medium ventris superans. Pedes breviusculi, femoribus posticis apicem abdominis non attingentibus, tibiis linearibus, haud gracilibus, brevissime puberulis, tarsis sat brevibus, articulo primo posticorum secundo longiore.

At once distinguished from the allied genera, apart from its other characters, by the thick subclavate antennæ which in their structure are very similar to those of many Myodochidae. The length of the rostrum cannot be stated in the carded type.