

HETEROTOMA, LATR.;

Capsus, FABR.

Ce genre a dans la forme beaucoup d'analogie avec le précédent; mais la forme du corps est plus naviculaire; et ce qui ne permet pas surtout de confondre les *Heterotoma* avec les *Phytocoris*, ce sont les deux premiers articles des antennes, qui sont beaucoup plus larges que les autres, le second principalement est très-grand et excessivement large et aplati dans toute sa longueur. Les deux derniers sont fort grêles.

Ce petit genre renferme trois ou quatre espèces de petite taille.

1. HETEROTOMA SPISSICORNIS.

Capsus Spissicornis, FABR., *Syst. Rhyn.*, p. 246, n. 28. — PANZ., *Faun. Germ.*, fasc. 2, n. 43. — LATR., *Gen. Crust. et Ins.*, t. III, p. 124. — *Cimex Meriopterus*, SCOP., *Ent. Carn.*, n. 382. — ROSSI, *Faun. Etr.*, II, p. 393, n. 1344. — Long. 2 lig. — Corps étroit, assez élancé, d'un vert-roussâtre bronzé; tête et antennes hérissées de petits poils roussâtres; élytres d'un vert bronzé, sans taches; pattes d'un jaune très-pâle. — Cette petite espèce se trouve dans la plus grande partie de l'Europe; on la rencontre aux environs de Paris sur les arbrisseaux et dans les buissons.

2. HETEROTOMA PULVERULENTA.

BURM., *Hand. der Ent.*, t. II, p. 276, n. 3. — Long. 4 lig. $\frac{1}{2}$. — Corps noir; antennes de la même couleur; élytres d'un noir-verdâtre, couvertes de petits poils blanchâtres; pattes noires, avec les jambes brunes. — France, très-rare.

STRONGYLOCORIS, BLANCH.;

Lygæus, FABR.; *Attus*, HAHN.

Corps arrondi. — Tête aussi large que le corselet. — Antennes longues et grêles dans toute leur étendue. — Pattes postérieures longues, les cuisses très-renflées.

Ce genre se reconnaît facilement à la forme sphérique du corps, et surtout aux pattes postérieures organisées pour le saut.

Obs. La dénomination d'*Attus*, appliquée à ce genre ne pouvait être conservée, parce qu'elle a été déjà donnée à un genre de l'ordre des Hyménoptères, et précédemment à un autre dans la classe des Arachnides.

4. STRONGYLOCORIS LEUCOCEPHALUS.

Cimex Leucocephalus, LINN., *Syst. nat.*, t. I, p. 2 et 726, n. 60; ejusd., *Faun. Suec.*, n. 940. — *Lygæus Leucocephalus*, FABR., *Syst. Rhyn.*, p. 237, n. 473. — WOLF., *Icon. Cim.*, 2, 76, tab. 8, fig. 73. — PANZ., *Faun. Germ.*, fasc. 92, n. 42. — Long. 4 lig. $\frac{1}{2}$. — Corps noir; tête d'un jaune-roussâtre, antennes noires, avec leur premier article jaune; corselet et élytres entièrement noirs; pattes rousses, avec les tarses bruns. — Cette espèce se trouve en France; elle n'est pas commune aux environs de Paris.

EURYCEPHALA, LAP.;

• *Halticus*, HAHN., BURM.; *Salda*, FABR.;*Lygæus Capsus* et *Phytocoris*, FALL.;*Orthonotus*, WESTW.; *Bryocoris*, FALL.;*Astemma*, SERV.

Ce petit genre a beaucoup d'analogie avec le précédent. Il en diffère par les antennes encore plus grêles et plus longues, et surtout par les élytres dépourvues de membrane, et par l'absence totale des ailes. — Les pattes postérieures sont fort longues, les cuisses très-renflées et tout-à-fait organisées pour le saut.

On ne connoît qu'une demi-douzaine d'espèces du genre *Eurycephala*, qui sont d'une taille très-exiguë et propres à l'Europe.

1. EURYCEPHALA APTERA.

Cicada Aptera, LINN., *Syst. nat.*, t. I, p. 2 et 740, n. 38; ejusd., *Faun. Suec.*, n. 894. — *Salda Pallicornis*, FABR., *Syst. Rhyn.*, p. 115, n. 6. — *Phytocornis Pallicornis*, FALL., *Hemipt. Suec.*, p. 143, n. 70. — HAHN., *Wanz.*, t. I, p. 114, tab. 48, fig. 61. — *Eurycephala Aptera*, BRULL., *Hist. nat. des Ins.*, t. IX, p. 440, pl. 33, fig. 6. — Long. 4 lig. — Corps d'un noir verdâtre très-brillant; antennes d'un jaune pâle, un peu plus rembrunies vers leur extrémité; élytres bronzées, assez fortement ponctuées; pattes de la même couleur que les antennes, avec la base des cuisses d'un brun-noirâtre. — Cette petite espèce se trouve dans la plus grande partie de l'Europe; on la rencontre aux environs de Paris: elle se tient ordinairement dans les endroits humides, sur les plantes, et particulièrement sur les ombellifères, où elle saute de feuille en feuille.