

nho apical encontra-se um pequeno campo de denticulos quitinosos. Harpágono esquerdo (fig. 15) em gancho, com várias cerdas longas e curtas revestindo toda a superfície convexa. Harpágono direito mutilado.

Planta hospedeira: Desconhecida.

Distribuição geográfica: Goiás, Brasil, *Holótipo*: 1 macho, Aragarças, Goiás, 1-1945 (Carvalho col.); *álotipo*: 1 fêmea, ibid., na coleção do autor. A genitália do holótipo acha-se montada em lâmina.

CHAVE PARA DETERMINAÇÃO DAS ESPÉCIES NEOTROPICAIS DO GÊNERO
"MACROLOPHUS" FIEBER

- 1 (2). Pêlos dos hemélitros com pontuação escura na base em toda extensão dos hemélitros; falo com grande campo de denticulos internamente; espécie robusta *M. basicornis* (Stål).
- 2 (1). Pêlos dos hemélitros sem pontuação escura na base ou esta presente apenas no clavo e região central comissural do cório, denticulos quando presentes somente no ápice do aedeagus; espécies delicadas 3
- 3 (2). Hemélitros com pontuação na base dos pêlos apenas no clavo, região comissural do cório e uma linha marginando a comissura cório-claval, no cório; segmento II da antena hialino; falo com 2 campos de espinhos no ápice *M. praeclarus* (Dist.).
- 4 (3). Hemélitros sem pontuação negra na base dos pêlos; segmento II da antena com ápice negro 5
- 5 (4). Hemélitros com larga faixa no clavo e região comissural do cório, escuras, esta última com 2 manchas brancas no centro
..... *M. aragarsanus* n. sp.
- 6 (5). Hemélitros com clavo e cório unicolores, espécie muito pequena
..... *M. cuiabanus* n. sp.

Solanocoris n. g.

Orthotylinae: gênero próximo a *Cyrtotylus* Bergroth, diferindo pela estrutura das antenas, pontuação do pronoto e conformação dos fêmures posteriores.

Corpo oblongo-oval, revestido com pilosidade longa, ereta, brilhante. Cabeça vista de cima mais larga que longa, vértice mais estreito que um olho (macho), levemente carenado posteriormente, frente saliente entre as antenas; olhos grandes, reentrantes posteriormente, fortemente granulados, contíguos à margem anterior do pronoto, margens internas, paralelas; vista de lado, olhos mais elevados que o vértice, este revestido de pêlos longos, eretos, gula, gena, búcula e lora muito reduzidos e obsoletos, tilo muito saliente, sua base na linha inferior dos pedúnculos oculares; vista de frente, muito mais larga que alta; rostro atingindo o ápice das coxas medianas, segmento I apenas tocando o xifo do prosterno. Antenas inseridas na linha mediana interna dos olhos, segmento I mais grosso que os demais, mais curto que a largura da cabeça, II 3 vezes mais longo que o I, com 2/3 de sua grossura, III ligeiramente mais fino, igual em comprimento a uma grossura dos respectivos segmentos.