

dess slida upptager $\frac{2}{3}$ af bukens längd. Täckvingarne räcka med sista hälften af apikalmembranen utom analspetsen, de äro i deras läderartade ända till membranen rikt besatte med små bruna, sneda borst och till färgen gräsgröna; men denna färg är icke tät, utan här och der framskynta små klara, hvitaktiga fläckar eller punkter; alldeles likadant äro äfven apicalmembranens 2:ne fält målade, nemligen gräsgröna med inströdda hvita atomer; ådrorna äro mycket fina och antingen af samma färg som fälten, eller ock grönaktiga; allt annat af apikalmembranen är hvitt, vattenklart; hinnvingarne tunna, fina, perlmorhvita, iriserande, med bleka, fina ådror.

Phytocoris molliculus FALL. Vid Garde d. 3 Juli.

— *seladonicus* FALL. På *Pimpinella Saxifraga* vid Stenstuga d. 25 Juli.

— *Populi* LIN. På asp vid Berga d. 5 Aug.

— *fulvo-maculatus* } På buskar i Berga skogs-
— *ferrugatus* } ängar d. 5—6 Aug.

Famil. Miridæ *) nob.

Lopus ferrugatus FALL. I ymnighet i Juni och Juli vid åkerrenar så väl på Gottland som på Fåhrö.

Lopus oculatus nob.: *elongatus*, 2 (cum alis $2\frac{1}{2}$) lin. decimal. long., angustus, pilosus, nigrofuscus; oculis coccineis; vertice lineis 2, pronoto 5, scutello 1, abdomineque 2 longitudinalibus flavis; hemelytris cinereis, secundum marginem costalem vitta albida. ♂.

*) Till denna familj höra 4 släkten, nemligen *Capsodes* nob., (med 2 Svenska arter, nemligen *albo-marginatus* FBR. och *gothicus* LIN.), *Panthilius* CURTIS, (med 1 Svensk art, nemligen *tunicatus* FBR.), *Lopus* HAHN. och *Miris* Auct. plur.