

** Membranzeile bogig. Höckerschwiele breit, parallel. Schnabelwurzel auf den halben Xyphus lang. Schild kurz, gleichseitig dreieckig. Augen gross, an die Wange reichend. Grund der vorspringenden Stirnschwiele in der Mittellinie der unteren Augenhälfte. Mittelbrust abgestützt, Hinterbrust ausgebogen, gewölbt, Fussglied 3 nur halb so lang als 2.

Gen. 35. **Camptoneura** Fieb. *rirgula* H.-Sch. (*Caps.*)

§ Nacken mit ganzer Querleiste oder kurzen Ansatz derselben an den Augen. Stirnschwiele am Grunde nicht auffallend geschieden.

§ Leiste im Nacken nur an den Augen sichtbar. Kopf in der Diagonale einer Rauté schief. Kehle kurz. Schnabelwurzel über den Xyphus lang. Scheitel in die Schwiele fast übergehend.

+ Gesicht schief, Wangen waglecht, Jochschnitt horizontal gegen das untere Augenende. Schnabel auf die dritte Bauchschiene reichend. Xyphus gleichseitig dreieckig. Mittelbrust stark eingekerbt. Hinterbrustmitte rechtwinklig, Ende gewölbt. Hinterfussglied 3 länger als 2.

Gen. 36. **Dichrooscytus** Fieb. *rufipennis* F. — *ratesianus* Mey. (*Caps.*)

†+ Gesicht vertical. Jochschnitt schief gegen die Mitte der unteren Augenhälfte und Fühlergrube. Wangenschnitt gegen das untere Augenende. Schnabel auf die erste Bauchschiene reichend. Mittelbrust eingekerbt, randklig. Hinterbrust breit stumpfekig mit Mittelschwiele. Hinterfussglied 2 fast länger als 3. Gen. 37. **Licoris** Fieb. *tripustulatus* Fa b. (*Caps.*)

§§ Leiste im Nacken ganz, mehr oder weniger stark erhaben.

+ Cuneus kurz dreieckig, kaum länger als am Grunde breit, bogenseitig. Hinterbrust sehr stumpf vorstehend.

a. Kopf dick, im Viertelkreis gewölbt, unten gerade. Wangenplatten breit, Schwiele bogig, breit, Grund fast in der Augenlinie. Schnabel an das Mittelbrustende, Wurzelglied auf den halben Xyphus reichend. Mittelbrust kurz, breit, hinten breitinnig, Rand aufstehend scharf, wellig.

Gen. 38. **Charageochilus** Fieb. *Gylbenhaii* Fall. (*Caps.*)