

stehend. . . . . Gen. 62. *Atractotomus* Fieb. *marginicornis* Fall. — *rufus* Fieb. — *fenorialis* Fieb. — *albipes* Fieb. etc. im Register.

§§ Fühlrglied 2 stabförmig, walzig, oder zum Ende höckerig.  
+ Stirnswiele aus dem verticalen Gesichte fast unter rechtem Winkel entspringend, breit vorstehend. Kopf im Viertelkreis gewölbt.

a. Xyphus gewölbt, Schwielengrund in der Augenlinie.

\* Fühlrglied 2 stets kürzer als 3, beim Mann am Ende unterseits höckerig; Glied 3 bogig. Schnabel an das Ende der hinten fast geraden Mittelbrust reichend, Wurzelglied etwas auf dem Xyphus liegend. Hinterbrust rechtwinkelig vorstehend, Mittelschwiele stark. Hinterfussglied 2 länger als 3. Gen. 63. *Marpocera* Curt. *thoracica* Fall. (*Caps.*)

\*\* Fühlrglied 2 länger als 3, stabförmig. Schnabel an das Ende der Hinterbrust reichend, Wurzelglied so lang als der gerade Unterkopf. Mittelbrust hinten ausgerandet. Hinterbrust kaum vorstehend, bogig, flachgewölbt. Fühlrgarbe am unteren Augenende. Hinterfussglied 3 länger als 2. . . . . Gen. 64. *Megalodactylus* Fieb. *macula rubra* Muls. (*Caps.*)

aa. Xyphus vertieft, kielrandig Kehle deutlich schief.

\* Augen sphäroidisch hoch an den Scheitel gerückt. Stirnswiele und Fühlrgarbe am unteren Augenende. Schnabel auf die Mitte der Hinterbrust, Wurzelglied fast auf den halben Xyphus reichend. Mittelbrust hinten eingekebt; Hinterbrust zugerundet gewölbt. Hinterfussglied 2 länger als 3, . . . . . Gen. 65. *Anoferops* Fieb. *setulosus* Mey. (nicht H.-Sch.) (*Caps.*)

\*\* Augen gross, nierenförmig, an oder auf die Wange reichend. Schwielengrund in der Augenlinie. Schnabelglieder stark, Stirnswiele breit, unter rechtem Winkel am Grunde vorstehend.