

α Pronotum länglich-trapezförmig. Kopf so lang als breit, fünfeckig. Schnabel an das Ende der sehr stumpf vorstehenden Hinterbrust reichend. Wurzelglied etwas auf den langspitzigen Xyphus ragend. Mittelbrust hinten abgestutzt, klein eingekebt.

Gen. 66. *Oncotylus* Fieb. *decolor* Fall. — *tanacetii* F. — *fenestratus* Fieb. — etc. im Register.

$\alpha\alpha$ Pronotum quer-trapezförmig. Kopf kürzer als breit, fünfeckig. Schnabel auf die dritte oder vierte Bauchschiene, Wurzelglied fast an das stumpfe Xyphusende reichend. Mittelbrust hinten eingekebt. Hinterbrust fast dick-kegelig, stumpf.

Gen. 67. *Conostethus* Fieb. *roseus* Fall. (*Caps.* F. H. Svec. 124. 17.)

†† Stirnswiele unter mehr oder weniger deutlich spitzem Grundwinkel von der Stirne entspringend oder übergehend.

α . Xyphus gewölbt.

* Stirnswiele aus spitzem Grunde von dem Gesichte entspringend.

α Gesicht und der im Rautenparallelogramm gerahmte Kopf schief. Kehle in gleicher Ebene mit dem Kopfe. Schwielenrund in der Angenlinie. Schnabel auf die dritte oder vierte Bauchschiene reichend, schlank. Wurzelglied auf den halben Xyphus lang. Mittelbrust hinten flach abgerundet, klein eingekebt. Hinterfussglied 2 länger als 3.

Gen. 68. *Tinicephalus* Fieb. *hortulanus* Meyer (*Caps.*) — *discrepans* Fieb. (Corsica.)

$\alpha\alpha$ Gesicht vertical an dem in der Raute eines Viereckes gerahmten Kopfe. Schwielenrund in der Angenlinie.

β Gesicht nach unten übergeneigt. Kopf dick, seitlich fast eiförmig. Kehle etwas schief. Stirnswiele stark, flachbogig. Schnabel stark, an das Ende der Mittelbrust, Wurzel-