

apicali excepto) subbreuiore. apice fusco-nigro; pronoto latitudine sua basali paullo ($\frac{1}{8}$) breuiore, mox pone medium sat constricto, annulo colli apice nigro-limbato, lobo antico nigro-trivittato, lobo postico sat fortiter dilatato, convexo et linea mediana tenui nigricante notato, angulis postici interdum nigricantibus; scutello nigro, utrinque flavo-callosa; hemelytris completis, abdomine distincte longioribus, clavo et corio punctis nigris destitutis, venis concoloribus, haud nigro-cinctis, limbo costali anguste testaceo-flavescente, membrana corio multo latiore, late rotundata, crebre fusco-venosa; dorso abdominis nigro, nitidulo, glabro; corpore subtus magnam ad partem nigro, lobo postico prostethii, acetabulis omnibus, vitta media ventris et connexivo flavo-testaceis; pedibus griseo-testaceis, femoribus obsolete fusco-punctatis, unguiculis nigris, femoribus anticis capite et pronoto simul sumtis $\frac{1}{4}$ brevioribus. ♂. ♀. Long. 8 mill.

Karagaiti, Adr-tör.

Primo intuitu *N. flavomarginato* SCHOLTZ affinis videtur, sed capite subtus nigro, articulo primo antennarum breuiore, hemelytris apicem abdominis distincte superantibus, venis corii et clavi haud nigro-cingulatis, interstitiis venarum haud nigro-conspersis, membrana crebrius venosa, dorso abdominis glabro, nitido femoribusque anticis brevioribus differt. A *N. fero* L. statura latiore aliisque notis mox distinguendus.

Dichrooscytus consobrinus n. sp.

Flavescens, pilis brevissimis et vix distinguendis nigris parce vestitus; capite basi pronoti circiter $\frac{1}{4}$ angustiore, vertice oculo $\frac{1}{4}$ latiore, utrinque ad oculum impressione transversa instructo; antennis corpore paullo brevioribus, articulo secundo latitudine basali pronoti $\frac{1}{4}$ longiore, articulis duobus apicalibus simul sumtis articulo secundo paullo brevioribus; rostro apicem versus nigricante; pronoto aequali ac apice lato basi longitudine sua duplo latiore, strictura apicali basi articuli secundi antennarum aequae crassa, callis bene discretis, disco postico subtilissime ruguloso; scutello hemelytris rufescentibus, limbo costali corii flavescente, cuneo alido, versus apicem minute rubro-consperso, membrana dilute fumata, rubro-venosa, macula marginali pone apicem cunei subhyalina, obsolete notata, areolis apicem versus fuscis; dorso abdominis versus basin nigro; tibiis fusco-spinulosis, tarsis apice fuscis; tarsis posticis tibia $\frac{2}{3}$ et latitudine capitis $\frac{1}{3}$ brevioribus, articulo tertio articulis duobus basilibus ad unum paullo breuiore. ♀. Long $4\frac{1}{2}$ mill.

Kok-dshajak.

D. pseudosabinae REUR. affinis videtur, sed vertice angustiore, articulis duobus apicalibus antennarum simul sumtis articulo secundo bre-