

sed specimen typicum Musei Helsingforsiensis commissuram mesonoto re vera $\frac{1}{3}$ breviorē praebet.

8. *Myrmecophyes limbatus* REUT.

! *Diplacus limbatus* REUT. Öfv. Finsk. Vet.-Soc. Förh. XXI. p. 172. (1879).

. *Myrmecophyes limbatus* REUT. Hem. Gymn. Eur. IV. p. 109 et 172. (1891).

Turkestan: Varzaminor!, Karakazuk, leg. A. FEDTSCHENKO. (Mus. Helsingfors.)

Specimen typicum (♀) Musei Helsingforsiensis e Varzaminor notas sequentes profert:

Capite basi pronoti $\frac{1}{3}$ latiore, vertice oculo fere duplo latiore; articulo primo antennarum latitudine verticis fere dimidio longiore, articulo secundo articulo praecedente $\frac{4}{5}$ longiore; pronoto transverso, basi longitudine sua fere $\frac{2}{5}$ latiore; mesonoto (sine scutello) pronoto $\frac{2}{5}$ breviorē, parum convexo, scutello vix discreto, transversim striguloso, concolore; commissura elytrorum mesonoto $\frac{1}{6}$ breviorē. Long. $3\frac{2}{3}$ mill.

9. *Myrmecophyes Kiritshenkoi* n. sp.

Brachypterus, elongatus, niger, subopacus, glaber; capite basi pronoti $\frac{2}{5}$ latiore, vertice plano et quam oculo $\frac{1}{3}$ (♂) vel paullo plus $\frac{1}{3}$ (♀) latiore; oculis sessilibus; antennis totis nigris, subglabris, articulo primo latitudine verticis $\frac{3}{4}$ (♂) vel vix $\frac{2}{5}$ (♀) longiore, lineari, sat gracili, apicem versus setulis paucis semierectis instructo, articulo secundo articulo primo triplo (♂) vel $2\frac{4}{5}$ (♀) et quam articulo tertio $\frac{7}{10}$ (♂) vel $\frac{2}{3}$ (♀) longiore, articulo quarto articulo tertio fere $\frac{2}{5}$ breviorē; rostro nigro, apicem coxarum posticarum attingente vel subsuperante; pronoto transverso, basi longitudine sua $\frac{2}{5}$ (♂) vel fere $\frac{2}{5}$ (♀) latiore, (e latere viso) subhorizontali, basi cum basi mesonoti fere in eodem plano posito, lateribus subrectis (♂) vel levissime rotundatis (♀); mesonoto (sine scutello) pronoto paullo breviorē, parum convexo, scutello minuto bene discreto, albido; elytris obsoletissime punctulatis, nigris, apice latissime rotundatis, albo-limbatis, limbo hoc albo extrorsum paullo ampliato, angulis apicalibus interno et externo rotundatis, commissura mesonoto $\frac{2}{3}$ breviorē; abdomine basi leviter coarctato, retrorsum sensim dilatato, in triente apicali (♂) vel paullo pone medium (♀) latissimo, marginibus lateralibus rectis (♂) vel nonnihl arcuatis (♀); pedibus nigris, femoribus posticis vel posterioribus interdum nigro-fuscis, posticis margine superiore setis semierectis remotis instructis, tibiis breviter nigro-spinulosis. Long. ♂ $3\frac{1}{3}$ — $3\frac{1}{2}$, ♀ $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ mill.

Turkestan: Makbal! in montibus Alexandrinis, 9870' s. m., leg. d. 2. et 3. Junii 1910 A. KIRITSHENKO. (Mus. Hung. et Helsingfors.)