

внутри клітокъ—бурая полосы; ниже cuneus замѣтно бурое пятнышко и передъ концомъ перепонки — бурая поперечная полоса. Нижняя сторона туловища блѣдно-желтоватая, покрытая рѣдкими красноватыми пятнышками. Бедра желтоватыя, концы ихъ, широкое кольцо по срединѣ каждаго бедра и голени — краснаго цвѣта; послѣднія покрыты густо золотистожелтыми приподнятыми волосками и шипиками. Лапки и когти рыжеватые, послѣдній суставъ лапокъ—на концѣ буроватый.

Одинъ экземпляръ этого вида былъ взятъ Дг. Дыбовскимъ на Уссури, подъ 48° с. ш.

*Lygus adustus* n. sp

Ganz punctirt und goldgelb behaart. Kopf braunröthlich, Stirnschwiele schwarz. Querleiste im Nacken braun, Pronotum grünlichgelb, vor dem lichten Hintersaume mit dunkelbraunem Bande. Schild grünlichgelb, am Grunde braun. Halbdecken schwarz mit grünlichem Bande. Cuneus orangegeb, am Ende schwarz. Bauch und Bruststücke schwarz, Kopf unten und Vorderbrust bleichgelblich. Beine röthlichgelb, Schenkel bräunlichroth. Schienbeine aus schwarzen Puncten schwarz behaart. Fühler rothgelb, Glied 2 am Ende schwarz, Glied 3 und 4 dunkelbraun. L. 5 mm.

Ussuri.

Весь пунктированный и покрытый нѣжными прилегающими волосками желтоватаго цвѣта; на переднеспинкѣ пунктиръ очень нѣжный, на надкрыльяхъ грубѣе и гуще расположенъ, такъ что точки между собою часто сливаются. Голова почти гладкая. Щитокъ мелко