

самый длинный, вчетверо длина ёе первого, третий суставъ втroe длина ёе первого и послѣдній на половину короче предпослѣдняго. Хоботокъ достигаетъ до втораго брюшнаго кольца, первый суставъ его гораздо длиннѣе головы. Переднеспинка впереди сильно съуженная съ боковыми краями прямymi; шейное кольцо ясное, также какъ и выпуклости въ передной части переднеспинки. Плечевые углы широкоокруглennes; задній край передъ щиткомъ весьма слабо выемчатый. Переднеспинка длиннѣе головы, ширина ея въ плечахъ въ полтора раза болѣе ея длины. Щитокъ длинный, довольно узкій. Первый суставъ лапокъ задней пары ногъ въ полтора раза длиннѣе втораго сустава, который равенъ третьему. Xyphus переднегруди широкій, трехъугольный, къ концу заостренный, съ килеватыми краями и по срединѣ вдавленный.

*S. sareptanus* n. sp.

Körper und Beine grünlichgelb; Oberseite fast glänzend, fein punctirt und sehr fein gelbbehaart. Pronotum, Rücken, Clavus am Grunde, Corium innen und zwei Flecke im Nackenbraunchwarz. Stirnschwiele schwarz. Kopfmitte, Pronotum, Seitenrand, ein Mittelstreif, Vorderrandkiel des Pronotum und Schild—gelb. Halbdecken aussen, Cuneus, Clavus am Ende und Fühler gelbröthlich; Fühlerglied 3 am Ende bräunlich. Membran rauchbraun, Zellrippen gelbröthlich, Jochstücke, Schnabelwurzel und Beine am Grunde grünlich; Schienbeine röthlichgelb, Schenkelende und Füsse bräunlich oder braunröthlich; Fühlerwurzel und Schenkel sehr fein schwarzbehaart; Schienbeindorne — schwarz.