

beinende und Füsse braun; Hinterschenkel braunröhlich, Schienbeindorne — bleichbräunlich. L. 4½ mm. Sarepta.

Голова черная, блестящая, съ сильнымъ затылочнымъ кантикомъ; сверху, предъ этимъ кантикомъ, приплюснутая. Переднеспинка и щитокъ желтоватыя, узкія окраины на переднемъ и заднемъ краяхъ переднеспинки, основные углы и конецъ щитка чернаго цвѣта. Вздутія въ передней части переднеспинки довольно сильныя, нѣсколько косо расположенные. Надкрылья укороченные, съ недоразвитой перепонкой; они грязнаго желтовато-блѣлаго цвѣта; *clavus* рыжеватый. Поперекъ задней половины надкрыльевъ, захватывая конецъ *clavus*, проходитъ широкая бурая полоса. *Cuneus* желтоватый, недоразвитой, на концѣ округленный, къ нему съ внутренней стороны примыкаетъ незначительный зачатокъ перепонки бураго цвѣта. Брюшко сверху рыжеватое, снизу буроваточерное; послѣдній генитальный суставъ съ боковъ ширококрасный. Первый суставъ усиковъ свѣтло желтоватый, остальные темнѣе, буроватожелтые, второй къ вершинѣ значительно утолщается. Хоботокъ желтоватый, у основанія бурый. Ноги буроватожелтые, бедра послѣдней пары красноватыя; концы голеней и лапки буроватые. Шипики покрывающіе голени — свѣтлобурые. Надкрылья мѣстами покрыты серебристыми волосками. Самецъ неизвѣстенъ. Дл. 4½ мм.

Описываемый видъ отличается отъ всѣхъ остальныхъ европейскихъ видовъ красноватымъ цвѣтомъ переднеспинки и щитка.

*G. albipennis* n. sp.

Ganz schwarz matt. Kopf und Buckel des Prono-