

liegend behaart, Fühlerglied 2—4 und Füße bräunlich. Hinterfusswurzel kürzer als Glied 2 und 3 zusammen. L.  $4\frac{1}{2}$  mm. Astrachan.

Блѣднозеленый, съ буроватыми полосками на передне-спинѣ, щитѣ и надкрыльяхъ. Вся наружная поверхность покрыта весьма короткими черными волосками. Голова едва болѣе развита въ длину, чѣмъ въ ширину, съ глубокой продольной бороздкой и высокимъ, поперечнымъ валикомъ. Переднеспинка болѣе развита въ ширину, чѣмъ въ длину, съ заднимъ краемъ очень слабо вырѣзаннымъ. Первый суставъ усиковъ и основаніе втораго блѣднозеленые, остальная часть втораго сустава и послѣдніе два, также какъ и лапки, блѣд-буроватые; первый суставъ усиковъ толстый, короткий, гораздо короче переднеспинки, покрытый черными прилегающими волосками. Лапки укороченныя; первый суставъ задней ихъ пары короче двухъ послѣднихъ вмѣстѣ взятыхъ.

Описываемый видъ найденъ мною въ Астрахани и очень похожъ на *T. ruficornis* Fall., но отличается болѣе широкимъ туловищемъ, укороченными усиками и лапками, а также ихъ цвѣтомъ.

#### 11. *Anoterops pennicornis* n. sp.

Gelblichgrün, fein schwarz behaart. Kopf glänzend, symmetrisch schwarz punctirt, die Punkte schwarz bedornt. Fühler stark, bräunlichgrün, Glied 1 gelblichgrün, innen schwarz punctirt, Glied 2 gleich lang als 3, stabförmig, glatt, Glied 3 am Grunde allmählig verdickt, unten federförmig weiss behaart. Pronotum und Schild einfarbig; Bucculae hinten schwarz begrenzt. Membran durchsichtig, schmal braun gesäumt, Zellrippen weisslich. Beine gelblichgrün, schwarz punctirt, Füße schwarz. L.  $5\frac{1}{2}$ — $5\frac{3}{4}$  mm. — Sarepta.

Свѣтлаго желтоватозеленаго цвѣта, покрытый нѣжными черными волосками. Голова блестящая, зеленоватожелтого