

третье черное же пятнышко, иногда слабо выраженное, помещается недалеко отъ втораго, нѣсколькоъ его выше, у вершины большой клѣтки и иногда соединяется съ нимъ черноватой полоской. Конецъ *clavus*, а равно конецъ щита иногда черноватые. Ноги блѣднозеленоватыя, голени покрыты очень нѣжными, черными щетинками; пятно у основанія голеней, концы лапокъ и едва замѣтные когти — черного цвѣта. Наружный край задней пары бедръ — буроватый. Дл. $1\frac{3}{4}$ — $2\frac{1}{4}$ мм.

Очень похожъ на *M. mundulus* Stål, но отличается нѣсколько менѣшей величиной, весьма короткимъ вторымъ суставомъ усиковъ и равномѣрною волосистостью надкрыльевъ.

Найденъ мною 15 мая 1881 г. въ Сарентѣ, въ количествѣ четырехъ экземпляровъ.

4. *Criocoris fuscipennis* n. sp.

♂ Körper schwarz, fein gräulich behaart. Kopf so breit als lang; Augen gross. Fühler schwarz, Glied 1 und 2 stark, Wurzelglied halb so lang als der Kopf, Glied 2 so lang als Hinterrand des Pronotum und dreimal langer als Wurzelglied; Glied 3 und 4 dünn, schwarzbraun. Halbdecken bleich bräunlichgelb, Corium-Ende und Cuneus braun; Membran bleich, Zellrippen bräunlich, kleine Rippe weisslich. Beine schwarz, Schenkelende und Schienbeine rostgelblich; Füsse ganz schwarz; Schienbeine schwarz bedornt, am Ende bräunlich. L. 4 mm. *Sarepta*.

Туловище черного цвѣта, покрытое нѣжными сѣроватыми волосками. Голова одинаково развитая какъ въ длину, такъ и въ ширину, съ большими глазами. Усики черного цвѣта, первый и второй суставы сильно утолщенные, массивные, изъ нихъ первый въ половину короче головы, а второй равенъ длиною заднему краю переднеспинки и втрое длиннѣе перв-