

ваго; послѣдніе два сустава тонкіе, нитевидные, съ буроватымъ оттѣнкомъ, изъ нихъ предпослѣдній на $\frac{1}{3}$, короче втораго, а послѣдній почти въ половину короче третьаго. Хоботокъ темнобураго, почти чернаго цвѣта. Надкрылья блѣдныя, буровато-желтныя, конецъ ихъ надъ мембраннымъ пивомъ и весь spineus бурые; перепонка такого-же цвѣта какъ и вся надкрылья, съ болѣе темными ребрами большой клѣтки; наружный край ея и внутренность большой клѣтки буроватые, внутреннее малое ребро — бѣловатое. Ноги черныя, концы бедръ и голени ржеватые; послѣднія на концѣ едва темнѣющія, съ длинными, черными шипиками. Лапки сплошна чернаго цвѣта. Дл. 4 мм. — ♀ неизвѣстна.

Одинъ экземпляръ былъ найденъ Беккеромъ въ окрестностяхъ Сарепты.

5. *C. ater* n. sp.

♀. Ganz schwarz, matt, oben sehr fein bräunlich behaart, unten silberweiss schuppenartig behaart. Kopf langer als breit, Fühler dünn, ganz röthlichbraun; Glied 2 so lang als Hinterrand des Pronotum. Halbdecken braunschwarz, Coriumende aussen schmal gelb. Membran rauchbraun, Rippen schwarz. Schenkel schwarz, Schenkelende, Schienbeine und Füsse — gelblichweiss, Schienbein-Grund und Ende und Klauenglied — schwärzlich. L. $2\frac{1}{2}$ mm. *Sarepta*.

Весь черный, матовый, сверху покрытый весьма пѣжными буроватыми волосками, снизу одѣтый серебристобѣлыми, чешуевидными волосками. Голова болѣе развитая въ длину, чѣмъ въ ширину, усики тонкіе, однообразнаго красновато-бураго цвѣта; второй суставъ ихъ равенъ длиною заднему краю переднеспинки. Надкрылья буровато-черныя, съ едва замѣтной, очень узкой желтоватой полоской на концѣ corium. Пере-