

## Новые виды изъ сем. Capsides.

В. Е. ЯКОВЛЕВА.

---

### 1. *Calocoris suturalis* n. sp.

Bleich, bräunlichgelb, kurz goldgelb behaart. Kopf und Pronotum glänzend, zerstreut lang abstehend behaart, Halbdecken und Körper matt. Kopf glatt, rostgelblich, Stirnschwiele mit grossem schwarzen Fleck. Fühler dünn, rostgelb; Schnabelendglied schwärzlich. Pronotum rostgelblich, auf der Mitte mit zwei schwarzen Flecken, hinten fein und zerstreut punctirt; Vorderrandkiel des Pronotum sehr schwach. Schild, Clavus innen und Innenwinkel des Corium braun. Membran bräunlich, Zellrippen schwärzlich, die kleine Zellrippe rostgelb. Unterseite gelblich, mit schwarzer durchlaufender Mittellinie und zwei Seitenstreifen. Beine gelblich, Schienbeine bleich, schwarz bedornt. Schenkel braunschwarz punctirt-gefleckt. L. mm. Nikolsk (Amur).

Свѣтлый, буровато-желтый, покрытый золотистыми волосками. Голова и переднеспинка блестящія, покрытыя рѣдкими, но довольно длинными, полустоячими волосками; надкрылья матовыя, какъ и остальная части тулowiща. Голова гладкая, рыжаго цвѣта съ большимъ чернымъ пятномъ на

носовомъ валикѣ. Усики одноцвѣтные, рыжіе, покрыты мѣдью чайшимъ пушкомъ; второй суставъ по всей своей длини толщинѣ, или едва замѣтно утолщается кверху; третий и четвертый суставы почти одинаковой толщины со вторымъ. Хоботокъ рыжій, послѣдній суставъ его черноватый. Шея неспинка къ заду слабо и рѣдко пунктированная, съ очень кимъ шейнымъ кольцомъ, рыжеватаго цвѣта, съ двумя пятнами на срединѣ. Щитокъ, клавальный шовъ внутренній уголъ сорium—бураго цвѣта, остальная же часть надкрыльевъ блѣднаго буровато-желтаго цвѣта, какъ и все ловище. У некоторыхъ экземпляровъ темнобурый цвѣтъ щитка и надкрыльевъ выраженъ не ясно. Перепонка бурова мелко-струйчатая, а часть ея заключающаяся въ вѣтви довольно грубо морщинистая; вѣшнее ребро мембранальны клѣточекъ темнобурое (темнѣе общаго фона перепонки), въ реннее же — рыжаго цвѣта; брюшко желтоватое, вдоль по срединѣ идетъ болѣе или менѣе развитая полоса чернаго цвѣта, а по бокамъ правильный рядъ черныхъ полосокъ. Ноги рыжеватыя, голени свѣтлѣе; бедра покрыты буровато-черными пятнами и точками, разбросанными безъ всякаго порядка; голени одноцвѣтныя, съ чернымъ ободкомъ на концѣ и сильными черными шипиками, которые изрѣдка раскиданы на бедрахъ. Послѣдній суставъ лапокъ на концахъ и кисти черноватые. Дл. 6 мм. Никольскъ, на Амурѣ.

Видъ этотъ стоитъ ближе всего къ *C. ticticensis* и *C. kei*, отличалась отъ нихъ совершенно инымъ цвѣторослиниемъ, какъ то присутствиѳ чернаго пятна на носу, тѣмнѣе щиткомъ и такимъ же клавальнымъ швомъ и т. д.

## 2. *C. fulvus* n. sp.

Ganz rostgelb, glänzend, Oberseite abstehend behaart. Kopf roströthlich, Stirnchwiele am Ende schwälich. Fühler ziemlich dicht abstehend behaart, rostge-

Glied 1 geröthet, am Ende schwärzlich, Glied 2 allmälich verdickt, schwarz, Grundtheile rostgelb, Glied 3 schwarz, am Grunde weisslich. Pronotum ganz punctirt, Vorderrandkiel sehr schwach. Pronotum über die Buckel schwärzlich. Schild und Halbdecken innen bräunlich, Cuneus rostgelb, röthlich gesäumt. Halbdecken ziemlich dicht punctirt und querrunzelig. Membran ganz gelbbraun. Beine roströthlich, Schenkel vor dem Ende mit bleichem Ring; Schienbeine gelb bedornt. Unterseite ganz roströthlich. L.  $7\frac{1}{2}$  mm. *Vladivostok.*

Туловище и надкрылья блестящія, однообразнаго рыжаго цвѣта, покрытые стоячими волосками такого же цвѣта. Голова и первый суставъ усиковъ рыжевато-красный, конецъ носа и вершина сустава черноватые; на затылкѣ замѣтна довольно глубокая продольная бороздка; второй суставъ усиковъ въ верхней своей части слегка утолщающійся, чернаго цвѣта, основная его половина рыжая; третій суставъ черный, съ бѣловатымъ кольцомъ у основанія. Всѣ усики густо покрыты довольно длинными, стоячими волосками. Переднеспинка, кроме переднихъ возвышений, вся пунктирована; точки пунктира поверхностныя; на переднихъ возвышеніяхъ замѣтно по черноватому пятну. Шейное кольцо очень узкое. Щитокъ и надкрылья во внутреннихъ своихъ углахъ нѣсколько темнѣе общаго цвѣта туловища; cuneus яркорыжій, съ красноватыми полосками по вѣнчному и мембранныальному краямъ. Надкрылья вообще довольно часто пунктированныя и поперечно-струйчатыя. Перепонка буровато-желтая, съ вѣточными ребрами такого же цвѣта, вершина ея темнѣе. Ноги красновато-рыжія; бедра съ болѣе свѣтлымъ кольцемъ передъ вершиной; голени кроме волосковъ покрыты еще рыжими щетинками. Снизу туловище однообразнаго красновато-рыжаго цвѣта безъ пятенъ. Дл.  $7\frac{1}{2}$  мм. *Vladivostok.*

3. *Macrotylus attenuatus* n. sp.

Ganz grün, oben dicht schwarz behaart, unten sehr fein weisslich behaart. Kopf länger als breit, Fühler bleich, Glied 3 und 4 bräunlich, Wurzelglied und Glied 2 am Ende, Glied 2 und 3 am Grunde, schwarz. Glied 2 gleichlang als 3, kaum länger als Hinterkopf und viel kürzer als Hinterrand des Pronotum. Schildspitze und Clavusende bisweilen schwärzlich. Membran durchsichtig, am Ende bräunlich, mit drei schwarzen Flecken; Zellrippen bleichgrünlich. Beine grünlich, Schienbeine am Grunde und Füsse am Ende schwarz; Hinterschenkel oberseits bräunlich; Schienbeine fein schwarz bedornt. Klauen sehr klein. L.  $1\frac{3}{4}$ — $2\frac{1}{4}$  mm. *Sarepta*.

Весь однообразного яркозеленого цвета; (сухие экземпляры принимают желтоватый оттенок, особенно на голове и переднеспинке); сверху густо покрыты короткими, черными, а снизу мельчайшими бледоватыми волосками. Голова несколько больше развита в длину, члены в ширину, с выпуклой лобной частью. Усики довольно толстые, бледоватого цвета, последние два сустава бледнобуроватые; первый сустав короткий, не достигающий конца головы, второй едва длиннее ширины головы и на  $\frac{1}{3}$  короче заднего края переднеспинки; третий равен длиною второму, но несколько его тоньше и вдвое длиннее четвертого; первый сустав с черными колышцами перед вершиной, широкое основание второго и третьего суставов, а также вершина второго — черного цвета. Надкрылья покрыты равномерно черными волосками; перепонка светлая, полупрозрачная, к концу слегка бурющаая; ребра ее блесток бледнозеленые (у сухих экземпляров почти бледные); блестки внутри буроватые; в основании угла перепонки, а также по внешнему краю ее, непосредственно подъ синус, по резкому, черному, пебольшому пятцу;

третье черное же пятнышко, иногда слабо выраженное, помещается недалеко отъ втораго, нѣсколькоъ его выше, у вершины большой клѣтки и иногда соединяется съ нимъ черноватой полоской. Конецъ *clavus*, а равно конецъ щита иногда черноватые. Ноги блѣднозеленоватыя, голени покрыты очень нѣжными, черными щетинками; пятно у основанія голеней, концы лапокъ и едва замѣтные когти — черного цвѣта. Наружный край задней пары бедръ — буроватый. Дл.  $1\frac{3}{4}$  —  $2\frac{1}{4}$  мм.

Очень похожъ на *M. mundulus* Stål, но отличается нѣсколько менѣшей величиной, весьма короткимъ вторымъ суставомъ усиковъ и равномѣрною волосистостью надкрыльевъ.

Найденъ мною 15 мая 1881 г. въ Сарентѣ, въ количествѣ четырехъ экземпляровъ.

#### 4. *Criocoris fuscipennis* n. sp.

♂ Körper schwarz, fein gräulich behaart. Kopf so breit als lang; Augen gross. Fühler schwarz, Glied 1 und 2 stark, Wurzelglied halb so lang als der Kopf, Glied 2 so lang als Hinterrand des Pronotum und dreimal langer als Wurzelglied; Glied 3 und 4 dünn, schwarzbraun. Halbdecken bleich bräunlichgelb, Corium-Ende und Cuneus braun; Membran bleich, Zellrippen bräunlich, kleine Rippe weisslich. Beine schwarz, Schenkelende und Schienbeine rostgelblich; Füsse ganz schwarz; Schienbeine schwarz bedornt, am Ende bräunlich. L. 4 mm. *Sarepta*.

Туловище черного цвѣта, покрытое нѣжными сѣроватыми волосками. Голова одинаково развитая какъ въ длину, такъ и въ ширину, съ большими глазами. Усики черного цвѣта, первый и второй суставы сильно утолщенные, массивные, изъ нихъ первый въ половину короче головы, а второй равенъ длиною заднему краю переднеспинки и втрое длиннѣе перв-

ваго; послѣдніе два сустава тонкіе, нитевидные, съ буроватымъ оттѣнкомъ, изъ нихъ предпослѣдній на  $\frac{1}{3}$ , короче втораго, а послѣдній почти въ половину короче третьаго. Хоботокъ темнобураго, почти чернаго цвѣта. Надкрылья блѣдныя, буровато-желтныя, конецъ ихъ надъ мембраннымъ пивомъ и весь spineus бурые; перепонка такого-же цвѣта какъ и вся надкрылья, съ болѣе темными ребрами большой клѣтки; наружный край ея и внутренность большой клѣтки буроватые, внутреннее малое ребро — бѣловатое. Ноги черныя, концы бедръ и голени ржеватые; послѣднія на концѣ едва темнѣющія, съ длинными, черными шипиками. Лапки сплошна чернаго цвѣта. Дл. 4 мм. — ♀ неизвѣстна.

Одинъ экземпляръ былъ найденъ Беккеромъ въ окрестностяхъ Сарепты.

5. *C. ater* n. sp.

♀. Ganz schwarz, matt, oben sehr fein bräunlich behaart, unten silberweiss schuppenartig behaart. Kopf langer als breit, Fühler dünn, ganz röthlichbraun; Glied 2 so lang als Hinterrand des Pronotum. Halbdecken braunschwarz, Coriumende aussen schmal gelb. Membran rauchbraun, Rippen schwarz. Schenkel schwarz, Schenkelende, Schienbeine und Füsse — gelblichweiss, Schienbein-Grund und Ende und Klauenglied — schwärzlich. L.  $2\frac{1}{2}$  mm. *Sarepta*.

Весь черный, матовый, сверху покрытый весьма пѣжными буроватыми волосками, снизу одѣтый серебристобѣлыми, чешуевидными волосками. Голова болѣе развитая въ длину, чѣмъ въ ширину, усики тонкіе, однообразнаго красновато-бураго цвѣта; второй суставъ ихъ равенъ длиною заднему краю переднеспинки. Надкрылья буровато-черныя, съ едва замѣтной, очень узкой желтоватой полоской на концѣ corium. Пере-

понка дымчатобурая, съ болѣе темными ребрами клѣтоекъ. Бедра чернаго цвѣта, вершина ихъ, а также голени и лапки желтовато-блѣлые; основаніе и концы голеней, а равно концы лапокъ съ когтями черноватые. ♀. Дл.  $2\frac{1}{2}$  мм. Самецъ неизвѣстенъ. *Capreola*.

---