

ными щетинками; второй суставъ тонкій, нѣсколько длиннѣе задняго края переднеспинки, чѣмъ этотъ видъ существенно отличается отъ *A. Kirschbaumi*. Переднеспинка и щитокъ съ весьма мелкими, нѣжными, понеречными струйками. Перепонка темная, ребра ея клѣтокъ чернаго цвѣта, а самыя клѣтки и ободокъ съ наружной стороны реберъ темнобурыя, почти черныя. Ноги черныя, вершины бедръ и полоска на наружной сторонѣ голеней рыжеватыя. Брюшко чернаго цвѣта, безъ свѣтлой окраины. Части груди снизу съ рыжеватыми пятнами, какъ у *A. Kirschbaumi*. Самка неизвѣстна. Дл. 3 м. м.

Оренбургская губернія (В. А. Баласогло).

Описываемый видъ очень близокъ къ *A. Kirschbaumi*, но отличается съ первого взгляда черными голеними, по наружному краю которыхъ проходитъ рыжая полоса (у *A. Kirschbaumi* голени сполна рыжія) и относительной длиною втораго сустава усиковъ, который длиннѣе задняго края переднеспинки, тогда какъ у *A. Kirschbaumi* этотъ суставъ гораздо короче задняго края; кроме того нѣсколько болѣе развитая голова, съ выпуклыми глазами и отсутствіе свѣтлыхъ полосъ вокругъ глазъ не позволяютъ смѣшивать этотъ новый видъ съ прежде извѣстнымъ.

12. *Myrmecoris rubricatus* n. sp.

Ganz rostroth, matt, kahl. Kopf sehr gross, verlängert, dreieckig; Augen sein gewölbt. Fühlerwurzel sehr kurz, gelb, Glied 2 oben verdickt, bräunlichroth, am Ende schwarz, Glied 3 sehr dünn, braunschwarz, am Grunde weisslich. Pronotum breiter als lang, vorn