

**МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАУНЫ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХЪ РОССИИ
И СОСѢДНИХЪ СТРАНЪ.**

B. Яковлева.

IX.

НОВЫЕ ВИДЫ АРАЛО-КАСПИЙСКОЙ ФАУНЫ.

1. *Odontoscelis minuta* n. sp.

Klein, oval, schwarzbraun; Oberseite gelbweiss behaart. Kopf gross, kürzer als Pronotum, silberweiss behaart und gelb beborstet; tylus breit, gewölbt, gelblich behaart. Fühler gleichfarbig, gelblich, Wurzelglied so lang als Glied 2 und 3 zusammen, Glied 2 kaum länger als 3, Glied 4 und 5 verdickt, Endglied viel länger als Glied 4. Pronotum doppelt breiter als lang, vorn verschmälert; Seitenrand gerade, gelb bedornt, Halsecke abgerundet, Schulterecke tief und schmal ausgeschnitten; Hintertheil des Pronotum bräunlich, Vordertheil gelb bedornt, Seitenrand silberweiss behaart. Schild mit drei breiten, geraden, gelben Streifen. Beine röthlich-braun, Füsse gelblich. L. $3\frac{1}{2}$ mm. *Derbent.*

Небольшой, овальный, темнобураго цвета; поверх-

ность покрыта короткими, но сильными желтоватобѣлыми волосками. Голова большая, съ выдающимся носовымъ валикомъ (*tylus*), на четверть короче переднеспинки; вся поверхность головы, также какъ и края ея нокрыты длинными торчащими желтоватыми щетинками и густыми волосами двухъ цвѣтовъ: вдоль широкаго носового валика желтоватыми, а по бокамъ головы серебристобѣлыми. Усики одноцвѣтные, желтоватые, первый суставъ длинный, равный второму и третьему взятымъ вмѣстѣ, второй едва длиннѣе 3-го, четвертый и пятый суставы утолщенные, изъ нихъ пятый равенъ первому и на половину длиннѣе четвертаго. Переднеспинка узкая, вдвое короче своей ширины, съуживающаяся кпереди, боковыя края ея прямыя, съ округленными и мало выдающимися шейными углами; боковыя вырѣзки передъ плечевыми углами узкія, но довольно глубокія. Задняя половина переднеспинки буроватая; передняя ея часть, также какъ и края, покрыты желтоватыми щетинками, а боковые края серебристобѣлыми волосками. Щитокъ не разширяющійся кзади, безъ черныхъ матовыхъ пятенъ, съ тремя широкими, прямymi желтыми полосами; средняя полоса продолжается по всей переднеспинкѣ и нѣсколько не достаетъ конца щитка; боковыя полосы короткія, далеко не достигающія ни основанія, ни конца щитка; внутренніе ихъ края оттѣнены чернымъ цвѣтомъ. Ноги красноватобурыя, съ желтыми лапками. Дл. $3\frac{1}{2}$ мм.

Одинъ экземпляръ изъ окрестностей Дербента, доставленный мнѣ А. В. Комаровымъ.

Самый маленький видъ этого рода, отличающійся широкими желтыми полосами, безъ черныхъ матовыхъ пятенъ, желтоватобѣлыми волосками и такого же цвѣта длинными щетинками на головѣ и передней части переднеспинки.

Для отличія между собою видовъ Odontoscelis, свойственныхъ русской фаунѣ, можетъ служить слѣдующая табличка:

- 1.—Pronotum—Halsecke deutlich die Augen überragend.
Oberseite ganz schwarz, ohne Flecken, kurz bedornt.
O. hispidula Jak.
- 1.—Pronotum—Halsecke nur bis auf den Hinterrand der Augen reichend. Oberseite dicht behaart, mit gelben und mattschwarzen Streifen und Flecken..... 2.
- 2.—Bauch hinten verschmälert, kaum langer als Kopf und Pronotum zusammen. Oberseite sehr kurz graubraun und grauweiss behaart..... *O. dorsalis* Fab.
- 2.—Bauch hinten verbreitet, viel langer als Kopf und Pronotum zusammen..... 3.
- 3.—Oberseite ganz rostbraun behaart und beborstet.
O. fuliginosa L.
- 3.—Oberseite zweifarbig behaart; Kopf und Pronotum auch oben lang beborstet..... 4.
- 4.—Oberseite braun und silberweiss behaart.
O. Komaroffii Jak.
- 4.—Oberseite weisslichgelb und silberweiss behaart. Fühler gleichfarbig, gelblich..... *O. minuta* n. sp.
2. *Sciocoris capitatus* n. sp.
- Gelblichgrau, ziemlich dicht schwarzpunctirt. Kopf sehr gross, eben, zungenförmig, so lang als breit und kaum schmäler als das Pronotum; Vordertheil des Kopfes merklich geneigt; Augen nicht gestielt; Kopfrand vor den Augen zahnförmig vorstehend und ziemlich tief ausgeschnitten. Pronotum quer, kaum kürzer als der Kopf; Seiten des Pronotum mit weiss-

lichem, farblos punctirtem Saum. Schild so lang als Corium, am Ende sehr verschmälerit; Membran bleich, durchscheinend, fein opaliserend, mit zerstreuten braunen Flecken zwischen den Rippen. Corium-Rand am Grunde weisslich. Hinterleib unter den Halbdecken breit vorragend; Bauch unten sehr fein punctirt; Connexivum gelblich, mit schwarzem Fleck in jedem Winkel. Schenkel schwarz punctirt.
L. $4\frac{1}{2}$ —5 mm. *Schachrud* (*Persien*).

Желтовато-серого цвета, съ поверхностью довольно густо пунктированной черными точками. Голова очень бодкая, несколько уже переднеспинки, плоская, языко-видной формы, одинаково развитая какъ въ длину, такъ и въ ширину; боковой край головного щитка передъ глазами глубоко вырѣзанъ и образуетъ впереди вырѣзки тупой зубецъ; передняя половина головы замѣтно погнута книзу; вся поверхность головного щитка сплошь пунктирована черными точками, такой же величины, какъ и на остальной поверхности; промежутки между точками гораздо большей величины чѣмъ сами точки. Переднеспинка поперечная, несколько короче длины головы; узкая, боковые окраины ея, отъ плечеваго угла бѣловатыя, остальная поверхность покрыта сплошнымъ чернымъ пунктиромъ, кромѣ двухъ гладкихъ мѣстъ въ передней части переднеспинки. Щитокъ одинаковой длины съ Corium, сильно съуживающійся къ концу; на немъ замѣтно несколько гладкихъ, слегка возвышенныхъ промежутковъ, между сгущенными точками пунктира. Перепонка светлая, полупрозрачная, съ слабымъ металлическимъ отливомъ и нѣсколькими буроватыми пятнышками по срединѣ; она достигаетъ конца брюшка.

Боковой край надкрыльевъ у основанія бѣловатый. Брюшко значительно выдается изъ подъ надкрыльевъ; connexivum желтоватый, съ двумя черными пятнышками въ обоихъ углахъ брюшныхъ сегментовъ; брюшко снизу безъ черныхъ пятенъ и очень нѣжно пунктиро-вано, тогда какъ на груди и головѣ точки такія же крупные, какъ и на поверхности тулowiща. Ноги свѣтло-желтоватыя; бедра покрыты черными точками, голени безъ шипиковъ. Дл. $4\frac{1}{2}$ —5 мм.

Два экземпляра этого вида были найдены Г. Ф. Христофоромъ въ сѣверной Персіи, въ окрестностяхъ Шахруда.

Описываемый видъ долженъ стоять рядомъ съ *S. Helferi* Fieb. и *S. terreus* Schr., но онъ отличается отъ нихъ очень большой головой, формою щитка, расположениемъ и величиной точекъ пунктира и отсутствиемъ черного рисунка на брюшкѣ снизу.

Carenoplistus n. gen.

Körper lânglich oval; Kopf schmal, zweimal lânger als breit, Seitenrand gerade, Jochstâcke sehr lang dornförmig, gerade, Stirnschwiele durchlaufend, viel kürzer als die Jochstücke. Fühler viergliederig, ziemlich dünn; Wurzelglied kurz, Glied 2 viermal länger als 1 und zweimal länger als 3; Glied 4 und 3 gleichlang. Wangenplatten linear, so lang als der Kopf, hinten abgerundet, vorn abgestutzt. Schnabel lang, an das Ende der zweiten Bauchschiene reichend, Wurzelglied fast so lang als der Kopf, Glied 2 und 3 gleichlang. Pronotum-Seiten gerade, vorn gezähnelt; Schulterecke stumpfspitzig. Schild lang. Bauchgrund rinnenförmig.

Туловище продолговатоовальное. Голова узкая, сильно вытянутая впередь, такъ что въ два раза длиннѣе ширины затылка; боковые края ея совершенно прямые; скуловые отростки очень длинные, въ формѣ прямыхъ, заостренныхъ шиповъ; конецъ носа (*tylus*) открытый, гораздо короче скуловыхъ отростковъ. Глаза небольшіе, очень выпуклые. Усики четырехсуставчатые, довольно тонкіе; первый суставъ очень короткій, не достигающій конца скуловыхъ отростковъ, второй самый длинный, по всей длини ровный, вчетверо длиннѣе первого и вдвое длиннѣе третьаго, который почти равенъ четвертому. Скуловыя пластинки простираются почти по всей нижней сторонѣ головы, не высокія, спереди прямо обрѣзанныя, сзади округленныя. Хоботокъ длинный, достигающій до третьаго брюшнаго кольца; первый суставъ его потти равенъ длиною головы, второй и третій равные между собою, четвертый короче прочихъ; изъ нихъ второй значительно сжать съ боковъ. Переднеспинка съуженная спереди, съ боковыми краями почти прямыми и спереди зазубренными; плечевые углы съ тупымъ зѣбцомъ впереди. Щитокъ длинный, въ полтора раза длиннѣе ширины у основанія, съ языковиднымъ, нѣсколько пріостреннымъ концомъ. Вдоль брюшка снизу проходитъ углубленная бороздка, особенно замѣтная на первыхъ кольцахъ брюшка. Ногъ недоставало у описываемаго экземпляра.

Описываемый родъ относится къ группѣ *Halyaria* Stal, заключавшей въ себѣ, до сихъ поръ, въ фаунѣ Европы, лишь два рода — *Mustha* Am. и *Apodiphus* Spin. Новый родъ имѣеть нѣсколько такихъ характерныхъ признаковъ, по которымъ его невозможно смѣшать ни съ одной изъ известныхъ уже и описанныхъ прежде формъ; для отличія его отъ прочихъ родовъ группы

Halyaria можетъ служить, между прочимъ, слѣдующая табличка:

- 1.—Fühler viergliederig. Jochst cke sehr lang, spießf rmig, gerade. *Carenoplistus* n. gen.
- 1.—Fühler f nfgliederig. 2.
- 2.—Mittelbrust ohne Mittelkiel; Kopf, Pronotum und Hinterleibrand s gez hnig; Jochst cke ziemlich kurz, spitzig. *Mustha* Am.
- 2.—Mittelbrust mit einem Mittelkiel; K rper ganzrandig; Kopf l nglich viereckig, Jochst cke parallel.

Apodiphus Spin.

3. G. Fixeni n. sp.

Oberseite gelbbr unlich, grob dicht punktiert; Unterseite, Kopf und F hler—schwarz. Kopf, Pronotum und Schildgrundtheile mit lichter durchlaufender Mittellinie; Kopfrand und ein Streif im Nacken gelbbr unlich. Vorder- und Seiten-Rand des Pronotum gelbbraun gerandet, innen schwarz umschattet. Schildgrundwinkel vertieft, schwarz, gelbgerandet; Schildende und Halbdecken fein r thlich. Bauch schwarz, Connexivum mit gelben Streifen am Grunde und der Ecke jeder Schiene. L. 14 $\frac{1}{2}$ mm.—*Semenowka*, 6000' (Transkaukasien).

Голова, туловище снизу и усики черного цв та; наружная сторона желтоватобурая, покрытая густымъ, грубымъ пунктиромъ черного цв та, часто между собою сливающимъ и образующимъ темные пятна. Вдоль головы, переднеспинки и щитка до половины идетъ св тлая продольная полоса; боковые края головы и дв  пояски вдоль затылка—желтоватобурыя, равно какъ и

края сколовыхъ пластинокъ снизу головы. Передній и боковые края переднеспинки оторочены узкой желтоватобурой каймой, которая съ внутренней стороны оттѣнена широкой черной полосой. Основные углы щитка глубоко вдавлены, эти углубленія черного цвѣта, отороченные съ внутренней стороны выпуклымъ, желтоватымъ бугоркомъ; надкрылья и конецъ щитка съ красноватымъ оттѣнкомъ. Брюшко сверху и снизу черное; соплехивум такого же цвѣта, съ желтоватыми попечечными полосками, по краямъ каждого брюшного кольца. Дл. $14\frac{1}{2}$ мм., ширина въ плечахъ 7, ширина брюшка $7\frac{1}{2}$ мм.

Видъ этотъ по общему *habitus*, цвѣту и величинѣ напоминаетъ *Jalla dumosa*, хотя не имѣть съ нимъ ничего общаго. Единственный экземпляръ этой оригинальной формы найденъ былъ докторомъ К. А. Фиксеномъ, во время путешествія его по Кавказу въ 1875 г., на высотѣ 6000', около деревни Семеновки.

4. *Strachia colorata* n. sp.

Körper oval, oben schwarzgrün metallisch. Kopf dreieckig, so lang als breit, vorn verschmälert, roth gerandet und mit schmalem rundem Fleck vor den Augen; Kopf unten roth, in der Mitte schwarz; Fühler und Schnabel schwarz; Schnabelwurzel roströthlich. Pronotum länger als der Kopf, grob punctirt, roth, mit zwei grossen Flecken. Halsecke stark gezahnt; Schulterecke abgerundet. Schild schwarz, in Hintertheil gekielt, die Spitze und Seitenfleck orangeroth. Corium-Rand am Grunde und Randlinie—roth; in der Mitte des Corium und

im Innenwinkel ein orangeröthlicher Fleck. Membran rauchbraun, Grund und Saum weisslich. Bauch oben und unten roth; Connexivum roth, mit schwarzen Grundflecken; ein breiter Streif über die Länge des Bauches schwarz; Seiten mit zwei Reihen schwarzer Querflecke. Bruststücke und Beine schwarz, Schenkel am Grunde roth L. $8\frac{1}{2}$ mm.—*Schachrud* (Persien).

Туловище продолговато-ovalное, сверху черного цвета, съ слабымъ металлическимъ отливомъ. Голова трехугольная, кпереди сильно съуженная, ширина ея взятая вмѣстѣ съ глазами равна длине; круглое пятно передь глазами и узкая наружная окраины скуловыхъ отростковъ краснаго цвета; голова снизу красная, только средняя часть ея черная; усики и хоботокъ также черного цвета, лишь первый суставъ хоботка рыбий. Переднеспинка длиннѣе головы, краснаго цвета, съ двумя большими черными пятнами, лежащими по сторонамъ срединной продольной полосы, шейный уголъ съ сильнымъ зубцомъ. Плечи округленныя. Переднеспинка, кромъ задняго края, грубо пунктирована. Щитокъ и надкрылья съ оранжевокрасными полосами и пятнами, расположение которыхъ напоминаетъ рисунокъ у *S. Putonii* и *S. dominula*; конецъ щитка и продолговатыя ovalные пятна почти по срединѣ боковыхъ краевъ его—оранжево краснаго цвета; вдоль щитка, въ задней половинѣ его, проходитъ возвышенное ребро, какъ у *S. Putonii*, но черного цвета. Основаніе наружнаго края надкрыльевъ краснаго цвета; далѣе во всю длину corium, до перепонки, идетъ красный кантъ; съ внутренней стороны главнаго ребра, почти въ центрѣ надкрыльевъ, помѣщается ovalное пятнышко, а надъ перепонкой попечечноovalное пятно оранжевокраснаго цвета. Окраины

и основание перепонки бѣловатыя, центръ же ея буро-ватаго цвѣта. Брюшко сверху и снизу краснаго цвѣта, connexivum съ черными продолговатыми пятнами въ основныхъ углахъ сегментовъ; по срединѣ брюшка снизу проходитъ широкая черная полоса, а по бокамъ его рядъ поперечно-ovalныхъ пятенъ того же цвѣта. Грудь совершенно черная, кромѣ наружныхъ боковыхъ окраинъ. Ноги чернаго цвѣта, основание бедръ и пятна съ нижней стороны ихъ—красныя. Дл. $8\frac{1}{2}$, м. м.

Видъ этотъ, открытый Г. Ф. Христофоромъ въ окрестностяхъ Шахруда, по расположению пятенъ на щиткѣ и согium очень близокъ къ *S. Putoni* Jak., но онъ гораздо уже его, пятна передне-спинки совершенно иной формы и самая передне-спинка длиннѣе, нежели у *S. Putoni*; затѣмъ отсутствие окрашенной продольной полосы на щиткѣ и цвѣть нижней поверхности туловища, а также ногъ не позволяютъ смѣшивать эти два вида.

5. *Maccevethus persicus* n. sp.

Körper bleich grünlich, sehr fein und dicht weissbehaart. Kopf grünlich, ein Mittelstreif und zwei Flecke im Nacken schwärzlich. Fühler ziemlich dünn, roströthlich, Wurzelglied und Glied 2 am Grunde schwarzgestreift; Glied 2 fast so lang als 3. Pronotum grünlich, sein schwarz punctirt; Schulterecke geröthet. Schild grünlich, am Grundwinkel schwarz punctirt. Halbdecken durchsichtig, röthlich. Bauch oben schwarz, Ende mit zwei gelben Streifen; Connexivum breit, ganz grünlich. Beine bleich bräunlichgrün, ganz fein schwarz punctirt. Hinterschenkel unten und Hinterschienbeine am Grunde

schwarz, Schienbeinende und Füsse bräunlich.
L. 7 mm. Schakù (N. Persien).

Туловище снизу однообразного блѣдно-зеленоватаго цвета; сверху свѣтлозеленое, мѣстами съ красноватымъ оттѣнкомъ и черноватыми пятнами. Все туловище и конечности густо покрыты очень короткими блѣдоватыми волосками. Голова зеленоватаго цвета, съ черноватыми полосками вдоль срединной ея линіи и съ внутренняго края глазъ. Усики довольно тонкие, хотя второй суставъ, сравнительно съ третьимъ, болѣе утолщенный; первый суставъ очень короткий, второй едва длиннѣе третьяго; всѣ суставы рыжевато-краснаго цвета; первый суставъ и основаніе втораго съ черноватыми полосками. Переднеспинка зеленоватаго цвета, покрытая чернымъ пунктиромъ; по боковымъ краямъ точки пунктира безцвѣтныя отчего эти края являются свѣтлозеленоватыми; плечевые возвышенности съ красноватымъ оттѣнкомъ. Щитокъ свѣтлозеленый, съ грушами черныхъ точекъ въ основныхъ углахъ. Надкрылья красноватыя, полуупрозрачныя. Брюшко сверху чернаго цвета, съ двумя продольными полосками на послѣднемъ сегментѣ; широкій connexivum одноцвѣтный, зеленый. Ноги блѣднаго, буроватозеленаго цвета, покрытыя мелкими, черными точками. Внутренняя сторона бедръ задней пары, основаніе голеней той же пары ногъ—чернаго цвета; концы голеней и суставовъ лапокъ—бурыя. Дл. 7 м. м.

Два экземпляра изъ окрестностей Шаку.

Отличается отъ *M. errans* болѣе тонкими усиками и цветомъ ихъ, ногами, испещренными черными точками, очень короткими волосками покрывающими туловище и меньшей величиной.

6. *Geocoris hirticornis* n. sp.

Bleich bräunlichgelb. Körper kahl, Fühler und

Beine sehr lang abstehend behaart. Pronotum quer, vorn wenig verschmälert; Seitenrand fast gerade. Pronotum und Schild grobpublirt, Halbdecken fein punctirt, in der Mitte glatt.
L. 3½ m. m. Schachrud (N. Persien).

Весь блѣднаго буроватожелтаго цвѣта. Переднеспинка и щитокъ довольно грубо пунктированы, на надкрыльяхъ же пунктира гораздо нѣжнѣе, а по срединѣ и вовсе отсутствуетъ, замѣщаюсь очень тонкими, едва замѣтными морщинками. Переднеспинка короткая, поперечная, вдвое шире своей длины, съ боковыми краями почти прямymi и весьма слабо суживающимися кпереди. Туловоще безволосое, усики, кроме послѣдняго сустава, и ноги покрыты очень длинными, прямостоячими волосками, въ видѣ щетинокъ. Перепонка полная. Дл. 3½ м. м.

Одинъ экземпляръ изъ окрестностей Шахруда.

По своему почти однообразному блѣдному цвѣту экземпляръ, по которому составлено описание, представляетъ можетъ быть незрѣлую форму, тѣмъ не менѣе видѣть этотъ очень хорошо отличается отъ другихъ до нынѣ извѣстныхъ ногами и усиками, покрытыми очень длинными, щетиноподобными волосками, которые примѣтъ, даже на суставахъ усиковъ, не разбросаны въ беспорядкѣ, а расположены правильными рядами.

7. *Emblethis solitarius* n. sp.

Schmutzig graugelb, ziemlich dicht punctirt. Kopf so lang als breit, Fühler dick, sehr lang zerstreut beborstet. Pronotum breiter als lang, vorn sehr verschmälert; Seitenrand fast gerade, ziemlich schmal, mit langen Borsten besetzt. Schild kürzer als Pronotum. Halbdecken zer-

streut punctirt. Pronotum und Halbdeckenrand gelbweisslich, fast durchsichtig, ohne Flecken. Membran gleichbraunlich, mit weisslichen Puncten zwischen den Rippen. Vorderschenkel stark, unterseits mit drei Stacheln, Hinterfusswurzel zweimal langer als Glied 2 und 3 zusammen. Bauch unten röthlichbraun, Connexivum gelblich, mit schwarzbraunen Grundflecken auf den Schnittstücken. L. $7\frac{1}{2}$ m. m. *Kirgisene Steppre.*

Грязного, желтовато-серого цвета, снизу красновато-бураго. Вся поверхность покрыта довольно сильным пунктиромъ, который гуще всего расположены на головѣ, а всего рѣже на надкрыльяхъ. Голова почти одинаково развита въ длину и въ ширину, съ пучкомъ длинныхъ щетинокъ на переднемъ концѣ; усики толстые, покрытые рѣдкими, но очень длинными стоячими волосками. Переднеспинка болѣе развитая въ ширину, съ боковыми краями почти прямыми, сильно суженными кпереди; шейный уголъ тупой, округленный, не выдающійся впередъ, а загибающейся къ заднему краю глазъ. Листоватые борты бокового края не широкіе, блѣдоватые, полуупрозрачные, безъ пятенъ, покрытые лишь такимъ же пунктиромъ, какъ и вся переднеспинка и кроме того отороченные рядомъ очень длинныхъ щетинокъ чернаго цвета. Голова, переднеспинка и щитокъ съ буроватымъ оттенкомъ; вдоль ихъ по срединѣ проходитъ мало явственная желтоватая полоска. Щитокъ большой, почти равносторонній, короче переднеспинки. Надкрылья вполнѣ развитыя, однообразнаго желтовато-серого цвета, съ рѣдкимъ пунктиромъ и едва замѣтными волосками у основания. Перепонка блѣдно-бурая, съ кругловатыми светлыми пятнами между реберъ. Ноги покрыты силь-

ными, рѣдкими, но не длинными щетинками, за исключениемъ бедръ передней пары, на которыхъ щетинки значительной длины сидятъ довольно густо; бедра эти съ нижней стороны вооружены тремя зубцами, изъ которыхъ самый сильный помѣщается впереди. Первый суставъ лапокъ задней пары ногъ болѣе чѣмъ вдвое длиннѣе остальныхъ двухъ суставовъ взятыхъ вмѣстѣ. Брюшко снизу буроватокрасное; широкіе боковые края его желтоватые, съ темнобурыми неправильными пятнами въ основныхъ углахъ сегментовъ. Дл. $7\frac{1}{2}$ м. м.

По своей величинѣ и формѣ усиковъ, съ толстыми суставами, видъ этотъ болѣе всего походитъ на *E. dilaticollis* Jak., но пная форма переднеспинки и длинные щетинистые волоски, отирающіе боковые края ея, сразу отличаютъ эти два вида между собою.

Одинъ экземпляръ взять былъ В. А. Баласогло около станицы Константиновской.

8. *Trapezonotus breviceps* n. sp.

♂ Kopf breiter als lang; Augen gross, gewölbt. Fühler schwarz, Wurzelglied und Schnabel rostgelb. Pronotum trapezförmig, vorn kaum verengt, Seitenrand gerade, sehr schmal, bräunlichgelb. Schild ganz schwarz. Halbdecken rostbraun, am Ende schwärzlich; Membran abgekürzt. Bauch ganz schwarz. Beine rostgelb, Hinterschenkel am Ende, und Mittel- und Hinterschienbeine am Grunde—schwärzlich. Hinterfusswurzel länger als Glied 2 und 3 zusammen. L. 4 mm. — *Batum* (Transkaukasien).

♂ Голова гораздо болѣе развита въ ширину, чѣмъ въ длину, съ большими, сильно выпуклыми глазами.

Усики чернаго цвѣта, первый суставъ ихъ, а равно хоботокъ рыжеватожелтые. Переднеспинка трапециоидальной формы, кпереди слабо съуженная, съ боковыми краями почти прямыми; задняя третья ея и боковые, узколистоватые края рыжеватые. Щитокъ весь чернаго цвѣта. Надкрылья съ укороченной перепонкой, буроваторыжія, къ концу постепенно чернѣющія. Брюшко совершенно чернаго цвѣта. Ноги рыжія; кольцо на вершинѣ задняго бедра и основанія голеней средней и задней пары черноватыя. Первый суставъ задней пары лапокъ длиннѣе остальныхъ двухъ суставовъ взятыхъ вмѣстѣ. Дл. 4 м. м.

Одинъ мужской экземпляръ этого вида открыть былъ А. В. Комаровымъ въ окрестностяхъ Батума.

9. *Calocoris sanguineus* n. sp.

Körper blutroth; Halbdecken und Extremitäten schwarz. Tylus, ein Strich im Nacken, zwei Flecken auf dem Vordertheil des Pronotum, Hinterrand des Pronotum, Brustmitte und Bauch unten—schwärzlich. Fühler dünn, Glied 2 oben sehr fein verdickt, Glied 3 bräunlich, am Grunde weisslich. Oberseite grob punctirt und quergerunzelt. Vorderrandkiel des Pronotum stark, breit. Membran und Zellrippen schwarzbraun. L. $8\frac{1}{2}$ mm.—*Batum* (Transkaukasien).

Тулowiще розовокраснаго цвѣта; надкрылья, усики, хоботокъ и ноги—черныя; носовой валикъ (tylus), полоска на затылкѣ, два небольшія пятна въ передней части переднеспинки, оторочка задняго ея края, средина груди и брюшко снизу—черноватыя. Усики тонкие, второй суставъ на вершинѣ слабо утолщающейся, тре-

тій бураго цвѣта, съ бѣловатымъ основаниемъ. Передне-спинка покрыта грубымъ пунктиромъ и поперечными морщинками; передний край ея съ широкимъ кольцомъ. Надкрылья густо пунктированы, такъ что точки часто сливаются между собою; перепонка и ея ребра однообразнаго темнобураго цвѣта. Дл. $8\frac{1}{2}$ м. м.

Одинъ экземпляръ изъ окрестностей Батума, отъ А. В. Комарова.

10. *Pachytoma nigrita* n. sp.

♂ Ganz schwarz, matt, dicht silberweiss behaart und schwarz gewimpert. Fühler dünn, schwarz, Wurzelglied zerstreut schwarz beborstet, Glied 2 fadenförmig, Glied 3 und 4 gleichlang, sehr fein und lang abstehend behaart. Pronotum vorn sehr verengt, dicht fein quergerunzelt. Halbdecken parallel, Membran schwarzbraun, Zellrippen schwarz. Beine schwarz, Schenkelende und Schienbeine oberseits rostgelblich, schwarz bedornt. L. $3\frac{1}{2}$ mm.—Orenburg.

♂ Весь черный, матовый, покрытый серебристобѣлыми чешуевидными волосками и черными стоячими щетинками. Усики тонкие, особенно послѣдние суставы, чернаго цвѣта; основной суставъ покрытъ рѣдкими, но очень сильными черными щетинками, преимущественно съ внутренней стороны; второй суставъ ровной толщины по всей своей длины, почти нитевидный и едва толще остальныхъ двухъ суставовъ; послѣдние три сустава, кроме мельчайшаго свѣтлого пуха, покрыты еще рѣдкими, длинными полустоячими волосками, очень тонкими и сѣроватаго цвѣта; второй суставъ самый длин-

ный, третий на одну треть его короче и ровенъ четвертому. Щеки и узкія кольца вокругъ глазъ желтовато-блѣдья; на затылкѣ между глазами замѣтны два черныхъ гладкихъ пятнышка. Переднеспинка сильно съуженная кпереди, густо покрыта поперечными мелкими струйками. Надкрылья полныя, съ боковыми краями параллельными; перепонка темнобурая, съ черноватымъ ре-бромъ большой клѣтки и оторочкой вокругъ него; внутренняго ребра малой клѣтки незамѣтно. Ноги черныя, вершина бедръ и виѣшняя сторона голени рыжеватыя; иногда голени кромѣ основанія и вершины совершенно рыжія, съ черными точками, несущими черные же шипики, расположеными по виѣшней сторонѣ. Самка неизвѣстна. Дл. $3\frac{1}{2}$ м. м.

Два экземпляра этого вида найдены В. А. Баласогло въ Оренбургской губерніи.

11. *Anapus longicornis* n. sp.

♂ Schwarz, matt, silberweiss schuppenartig behaart und schwarz beborstet. Fühler rostgelb, Wurzelglied schwarz, am Ende sehr verdickt und stark beborstet, Glied 2 dünn, etwas langer als Hinterrand des Pronotum. Schild und Pronotum sehr fein querrunzelig. Membran schwärzlich, Rippen schwarz. Beine schwarz, Schenkelende und Schienbeine von aussen rostgelblich. L. 3 mm.—Orenburg.

♂ Черного цвѣта, матовый, покрытый серебристыми чешуевидными волосками. Голова черная, съ выпуклыми большими глазами, вокругъ которыхъ нѣть свѣтлыхъ круговъ, какъ у *A. Kirschbaumi* Stål; щеки блѣдовато-желтая. Усики свѣтлорыжие, основной суставъ черный, къ концу значительно утолщенный, съ сильными, чер-

ными щетинками; второй суставъ тонкій, нѣсколько длиннѣе задняго края переднеспинки, чѣмъ этотъ видъ существенно отличается отъ *A. Kirschbaumi*. Переднеспинка и щитокъ съ весьма мелкими, нѣжными, понеречными струйками. Перепонка темная, ребра ея клѣтокъ чернаго цвѣта, а самыя клѣтки и ободокъ съ наружной стороны реберъ темнобурыя, почти черныя. Ноги черныя, вершины бедръ и полоска на наружной сторонѣ голеней рыжеватыя. Брюшко чернаго цвѣта, безъ свѣтлой окраины. Части груди снизу съ рыжеватыми пятнами, какъ у *A. Kirschbaumi*. Самка неизвѣстна. Дл. 3 м. м.

Оренбургская губернія (В. А. Баласогло).

Описываемый видъ очень близокъ къ *A. Kirschbaumi*, но отличается съ первого взгляда черными голеними, по наружному краю которыхъ проходитъ рыжая полоса (у *A. Kirschbaumi* голени сполна рыжія) и относительной длиною втораго сустава усиковъ, который длиннѣе задняго края переднеспинки, тогда какъ у *A. Kirschbaumi* этотъ суставъ гораздо короче задняго края; кроме того нѣсколько болѣе развитая голова, съ выпуклыми глазами и отсутствіе свѣтлыхъ полосъ вокругъ глазъ не позволяютъ смѣшивать этотъ новый видъ съ прежде извѣстнымъ.

12. *Myrmecoris rubricatus* n. sp.

Ganz rostroth, matt, kahl. Kopf sehr gross, verlängert, dreieckig; Augen sehr gewölbt. Fühlerwurzel sehr kurz, gelb, Glied 2 oben verdickt, bräunlichroth, am Ende schwarz, Glied 3 sehr dünn, braunschwarz, am Grunde weisslich. Pronotum breiter als lang, vorn

verbreitet, hinten sehr verschmälert und geschnürt; Vorderrand braun. Schild viel länger als Pronotum. Halbdecken rauchbraun, fast durchscheinend; ein dreieckiger Grundfleck und eine Binde hinten schneeweiss. Membran mit ungetheilter Zelle. Beine roströthlich, Hinterschenkel am Ende und Schienbeine kaum dunkler; Füsse bräunlich, Fusswurzel weissgelblich; Schienbeine braunroth bedornt. L. 5 $\frac{1}{2}$ mm. *Orenburg.*

Весь однообразного рыжеватокрасного цвета, матовый, безволосый. Голова очень большая, вытянутая, трехугольной формы, съ слабо выпуклыми, большими глазами. Первый суставъ усиковъ короткий, въ пять разъ короче длины головы, свѣтложелтаго цвета; второй суставъ къ вершинѣ расширяющійся, буроватокрасного цвета; утолщенная вершина его черная; третій суставъ нитевидный, темнобураго цвета, съ бѣлымъ широкимъ кольцомъ у основанія (четвертаго недостаетъ). Переднеспинка короткая, болѣе развитая въ ширину, кпереди расширенная, кзади сильно суженная, съ глубокой перемычкой передъ заднимъ краемъ; боковые края округленные, передний въ видѣ широкаго, выпуклого валика темнобураго цвета; посреди переднеспинки замѣтна продольная, нѣсколько выпуклая темная полоска. Щитокъ гораздо длиннѣе переднеспинки, посрединѣ сильно приподнятый кверху, передъ концомъ силюснутый, однообразного, рыжеватокрасного цвета. Надкрылья, вмѣстѣ съ перепонкой, дымчатобурыя, съ двумя широкими поперечными полосами синѣжнобѣлаго цвета: одною почти у основанія, другою передъ си-*neus* и мембранальнымъ швомъ; перепонка большая, съ одной большой клѣткой. Ноги рыжеватокрасныя, концы

бедръ задней пары, а равно голени, и́й сколько темнѣе общаго цвѣта туловища; шипики на голеняхъ буровато-красные. Первый суставъ лапокъ бѣловатожелтый, а остальные буроватые. Дл. $5\frac{1}{2}$ мм.

Одинъ экземпляръ этого красиваго и оригинального вида оказался въ коллекціи Эверсмана, изъ окрестностей Оренбурга.

Laemocoris n. gen.

Körper klein, linear. Kopf oben dreieckig; Gesicht vertical; Augen halbkugelig. Nacken mit Querleiste. Fühler dünn, lang; Wurzelglied etwas über halbe Kopflänge, Glied 2 viermal länger als 1, Glied 3 kürzer als 2, Endglied fast so lang als Glied 1. Schnabel dünn, bis auf die Mitte des Hinterleibes reichend; Wurzelglied kaum kürzer als der Kopf. Vorderbrust vertieft, Mittelbrust hochgewölbt, mit feiner durchlaufender Furche. Pronotum schmal, kegelig; Vorderrand gerade, ohne Kiel. Schild kegelig, gewölbt. Membran mit ungetheilter Zelle. Beine lange, dünn; Hinterfusswurzel kürzer als Glied 2.

Голова вертикальная и, если глядѣть сверху, трехугольная, длинная, съ выпуклыми глазами; сзади глазъ перетянутая и образующая шею; между глазами идеть поперечный затылочной валикъ. Усики длинные, тонкие, нитевидные; первый суставъ ихъ вдвое короче головы, второй вчетверо его длиннѣе, третій равенъ двумъ третьемъ втораго и послѣдній, очень короткій, едва длиннѣе основнаго. Хоботокъ тонкій, длинный, достигающій почти средины брюшка; первый суставъ едва короче го-

ловы, второй почти равенъ ему по длинѣ; третій всѣхъ длиннѣе. Переднеспинка трапециoidalной формы, сильно съуженная кпереди, на подобіе шеи; боковые края ея прямые, слабо вогнутые посерединѣ; плечевые углы вытянуты въ тупое остріе; задній край съ вырѣзкой передъ щиткомъ, передній прямой, безъ канта; по задней, выпуклой, части переднеспинки проходить возвышенное ребро. Щитокъ у основанія вогнутый, послѣдняя же его половина сильно выпуклая въ видѣ конуса. Перепонка съ одной кѣлткой, весьма не ясно выраженной, такъ что видѣть ея очертанія можно только при сильномъ увеличеніи. Брюшко узкое и короткое, не выдающееся изъ-подъ надкрыльевъ (♂). Переднегрудь вдавленная, среднегрудь сильно выпуклая, съ нѣжной продольной бороздкой. Ноги тонкія, длинныя. Первый суставъ лапокъ задней пары ногъ короче втораго.

13. *L. Reiteri* n. sp.

Schwarzbraun, oben zerstreut langbeborstet.
Fühler gelbbraun, Wurzelglied röthlichgelb,
Glied 2 am Ende und Glied 1 am Grunde
bräunlich; Halbdecken bräunlichgelb, auf dem
Corium zwei dreieckige weisse Flecken, von
denen einer an der Spitze, der andere vor der
Mitte desselben steht. Cuneus braunschwarz.
Membran rauchbraun, die Querbinde weiss.
Beine bräunlich, Hinterschenkel schwarzbraun,
Schienbeinende und Füsse schmutziggelb L.
3 mm.—*Krasnowodsk.*

Все туловище красноватобурое, почти черное. Вдоль головы проходитъ бороздка. Первый суставъ усиковъ рыжий, къ основанию темнѣе; остальные суставы желто-

ватобурые, второй къ вершинѣ постепенно темнѣющій. Надкрылья коричневожелтые, cuneus весь темнобурый; на вѣшии краю corium, у основанія его и на концѣ, находится по большому бѣлому пятну трехугольной формы; вершина первого трехугольника занимаетъ средину clavus'a. Пятна эти съ внутренней стороны окраены темнобурою полоской; узкій наружный край corium, между двумя бѣлыми пятнами, также бѣлый, съ бурой оторочкой изнутри. Перепонка дымчатобурая, у основанія нѣсколько темнѣе; поперекъ ея проходитъ свѣтлая, прозрачная полоса; наружный край ея бѣловатый. Основные суставы ногъ, также какъ основаніе и вершина бедръ, бѣловатые; самыя бедра, особенно задней пары, бурыя, а голени буроватыя, къ концу свѣтлѣющія. Надкрылья покрыты рѣдкими, но весьма сильными щетинками бѣлаго цвѣта, а голова и переднеспинка рѣдкими, стоячими, буроватыми волосками. Дл. около 3 мм. Самка неизвѣстна.

Два экземпляра этого вида были открыты въ окрестностяхъ Красноводска И. Е. Фаустомъ.

14. *Macrotylus fulvicornis* n. sp.

Bleichgrünlich, schwarz abstehend behaart, unten sehr fein weisslich behaart. Kopf länger als breit; Fühler ziemlich stark, rostgelblich, sehr fein weisslich behaart, Wurzelglied am Ende braun, Glied 2 und 3 am Grunde bräunlich, Glied 2 kaum länger als der Hinterrand des Pronotum. Halbdecken bleichgrünlich, Seitenrand des Corium am Ende roströthlich, cuneus bleich, Membran bräunlich, Zellrippen weisslich, Zellen und Strich aussenbraun. Beine grünlich, Schienbeine sehr fein behaart und

kurz bedornt, Schienbeine am Grunde und Füsse bräunlich, Schenkel fein schwarz punc-tirt, Klauen kaum sichtbar. L. 4 mm.—*Sarepta*.

Однообразного, блѣднозеленоватаго цвѣта, съ по-верхностью покрытою черными стоячими волосками; снизу туловище одѣто очень нѣжными, едва замѣтными, блѣдоватыми волосками. Голова болѣе развита въ длину, чѣмъ въ ширину, съ черноватыми пятнами у основания носового валика. Усики довольно толстые, рыжеватые, покрытые весьма нѣжными и короткими блѣдоватыми во-лосками; первый суставъ съ темнобурой вершиной; ос-нованіе втораго и третьяго суставовъ слегка буроватое; второй суставъ нѣсколько длиннѣе задняго края перед-неспинки. Всѣ части надкрыльевъ блѣднозеленоватыя; наружный край *corium*, надъ *cuneus*, рыжій; перепонка свѣтлобуроватая, съ бѣлыми ребрами кѣтокъ; внутрен-ность кѣтокъ, а также полоска виѣ ихъ и боковой наружный край перепонки темнобурого цвѣта. Ноги зеленоватыя, голени покрыты мельчайшими волосками и очень короткими, едва замѣтными шипиками; кольцо у основанія голеней и лапки буроватыя. Съ наружной стороны бедра несутъ рядъ слабыхъ черноватыхъ пят-нышекъ. Когти почти незамѣтны. Дл. 4 мм. Сарепта, въ одномъ экземпляре.

15. *Oncotylus affinis* n. sp.

Bleich grünlich, oben schwarz, unten sehr fein weisslich behaart. Kopf so lang als breit, Au-gen fein gewölbt. Fühler ziemlich stark, sehr fein schwarz behaart, Glied 2 bleich rostgelblich, viel länger als der Hinterrand des Pro-notum. Halbdecken weisslich, Membran bleich;

Zellrippen weiss, Zellen bräunlich. Schenkel schwarz, punctirt, Füsse am Ende und Klauen schwarz. L. 5 mm. — *Krasnowodsk*.

Однообразного блѣднозеленаго цвѣта; вся наружная поверхность наскомаго покрыта довольно длинными, полустоячими черными волосками; туловище снизу одѣто, довольно густо, короткими, бѣловатыми волосками. Голова одинаково развита какъ въ длину, такъ и въ ширину, съ глазами умѣренной величины и слабо выпуклыми. Усики довольно толстые, покрытые черными короткими волосками; второй суставъ ихъ длинный, блѣднорыжеватаго цвѣта и почти въ полутора раза длинѣе задняго края переднеспинки; посльдниятъ не много болѣе развита въ ширину, чѣмъ въ длину и сильно сужена спереди. Надкрылья почти бѣловатыя, одноцвѣтныя; перепонка свѣтлая, съ бѣлыми ребрами клѣтокъ; внутренность клѣтокъ и малое ребро слегка буроватыя. Бедра, особенно съ нижней стороны, покрыты мелкими черными точками; конецъ лапокъ буроватый, когти чернаго цвѣта. Дл. 5 мм.

Видъ этотъ болѣе всего напоминаетъ *O. persicus* Reit., но отличается отъ него главнымъ образомъ формою головы, относительной длиною втораго сустава усиковъ и расположениемъ черныхъ волосковъ на поверхности; именно, у *O. persicus* голова короткая и потому гораздо болѣе развитая въ ширину, съ очень большими, выпуклыми глазами; второй суставъ усиковъ короче задняго края переднеспинки, а черные волоски покрываютъ лишь надкрылья, щитокъ же, переднеспинка и голова одѣты бѣловатыми волосками.

Одинъ мужской экземпляръ описываемаго вида происходитъ изъ окрестностей Красноводска, гдѣ онъ былъ открытъ Г. Христофоромъ.

16. O. plumicornis n. sp.

♂ Strohgelb, oben schwarz bedornt; Halbdecken weiss behaart, Bauch grünlich, sehr fein gelb behaart. Fühler und Beine fein und dicht schwarz behaart. Beine ohne Flecken, Schienbeinende und Dorne schwarz; Füsse schwarz. Fühler ziemlich stark, Glied 1 und 2 strohgelb, Glied 3 schwarzbraun, am Grunde bleich gelb, Endglied bräunlichgelb; Glied 2 viel länger als Hinterrand des Pronotum, Glied 1 und 4 gleich lang; Glied 3 unten regelmässig lang behaart. L. 5 mm. — *Sarepta*.

♂ Соломенножелтаго цвета, мѣстами съ зеленоватымъ оттенкомъ; брюшко зеленоватое, кроме генитальныхъ суставовъ, которые яркожелтаго цвета. Наружная сторона покрыта черными, сильными щетинками, надкрылья сверхъ того имѣютъ еще короткие блестящие волоски; на брюшкѣ снизу волоски очень короткие, желтоватые. Усики и ноги покрыты довольно густо очень короткими нѣжными, чёрными волосками, а голени сверхъ того и черными щетинками; ноги безъ пятенъ, концы голеней и лапки темнобураго, почти черного цвета. Усики довольно толстые, первые два сустава соломенножелтаго цвета, кажущагося нѣсколько темнѣе противъ общаго цвета туловища, отъ густаго покрова черныхъ волосковъ; суставъ третій темнобурый съ светложелтымъ кольцомъ у основанія; четвертый — буроватожелтый; во всю длину третьяго сустава, съ нижней его стороны, идетъ правильный рядъ очень длинныхъ волосковъ, расположенныхъ въ видѣ бородки пчелиной; второй суставъ гораздо длиннѣе ширины задняго

края переднеспинки, третій на одну треть его короче, четвертый же равенъ длиною первому. Дл. 5 мм.

Одинъ мужской экземпляръ изъ Сарепты; отличается оть всѣхъ другихъ видовъ перообразнымъ расположениемъ длинныхъ волосковъ на третьемъ суставѣ усиковъ, которое встрѣчается еще только въ одномъ родѣ, именно у *Anoterops* (*A. pennicornis* Jak.), описанномъ мною недавно изъ той же мѣстности.

17. *Atractotomus nigritarsis* n. sp.

♀ Schwarz, matt. Fühlerglied 1 und 2 schwarz, dicht schwarz langbehaart; Glied 2 massiv, spindelig, Glied 3 und 4 dünn, weisslich, am Grunde bräunlich. Schenkel schwarz, Schenkelende und Schienbeine bleich rostgelblich, schwarz bedornt; Schienbeinende und Füsse schwarz. L. $3\frac{1}{2}$ mm.—Orenburg.

♀ Туловище черного цвѣта; первые два сустава усиковъ черные, густо покрытые такого же цвѣта длинными прилегающими волосками, второй суставъ массивный, веретенообразной формы, причемъ наиболѣе сильное утолщеніе его приходится ближе къ верхнему концу; остальные два сустава весьма тонкіе блѣдоватаго цвѣта, съ буроватымъ основаніемъ. Надкрылья буроватыя, къ наружному краю темнѣющія, иногда совершенно черныя; ребра перепонки слѣтлобурья, клѣтки внутри и пятно снаружи, у малой внутренней клѣтки, свѣтлѣе общаго фона перепонки. Бедра черного цвѣта, вершины ихъ и голени блѣднорыжеватыя; концы голеней и лапки черного цвѣта; голени безъ черныхъ точекъ; и покрыты нѣжными черными шипиками. Дл. $3\frac{1}{2}$ мм.

Отъ всѣхъ другихъ видовъ этого рода *A. nigritar-*

sis отличается, съ первого раза, лапками чернаго цвѣта, которые встрѣчаются еще только у *A. albipennis* Rt., къ которому вообще описываемый видъ близокъ, отличаясь цвѣтомъ надкрыльевъ и формою втораго става усиковъ; послѣдній у *A. albipennis* болѣе массивенъ и укороченъ и покрытъ болѣе нѣжными и тонкими волосками.

Одинъ экземпляръ этого вида, изъ окрестностей Оренбурга, оказался въ коллекціи Эверсмана, а другой былъ найденъ В. А. Баласогло въ той же губерніи, безъ точнаго обозначенія мѣстонахожденія.