

weiss. Beine schwarz, Schenkelende und Schienbeinende grünlich. Brust ganz grün, Hinterleib schwarz.

Länge 2— $2\frac{1}{2}$ mm.

Передняя часть туловища яркозеленаго, брюшко и надкрылья — чернаго цвѣта; вся поверхность густо покрыта сильными черными стоячими волосками. Голова яркозеленая, съ черными глазами; усики короткие, черные, конецъ 2-го сустава и два послѣдніе буроватые; 1-й суставъ оканчивается наравнѣ съ головой, а 2-й очень короткій и остальные два вмѣстѣ длиннѣе его. Переднеспинка сильно суженная кпереди, съ боковыми краями прямыми и съ переднимъ краемъ, вырѣзаннымъ посерединѣ и имѣющимъ форму выпуклого кантика; вся она зеленаго цвѣта, по заднему краю нѣсколько темнѣе и съ темною полоскою посерединѣ, не доходящую до переднаго края. Щитокъ черный, основаніе его — или, по крайней мѣрѣ, основные углы — зеленоватые. Надкрылья, вмѣстѣ съ перепонкой, бархатисто-черныя, кроме небольшой и не всегда явственной полоски у плечеваго угла, которая бываетъ зеленоватаго цвѣта; конецъ *corigum'a* надъ *cuneus'омъ* съ ярко-блѣющей поперечной полоской, конецъ *cuneus'a* и ребра внутренней мембранныальной клѣтки блѣлые; ребро же большой клѣтки и самыя клѣтки внутри — чернаго цвѣта, какъ и остальная часть надкрыльевъ. Ноги черныя, концы бедръ и конечныя части голеней зеленоватые. Снизу — всѣ части груди зеленаго цвѣта, а брюшко — чернаго.

Этотъ видъ встрѣчается изрѣдка, по склонамъ Верхоленскихъ горъ и у д. Разводной, на низкой травѣ, въ концѣ июня и въ началѣ июля.

15. *Rhopalotomus niger* n. sp.

Ganz schwarz, fein metallschimmernd, Schienbeine dunkelbraun. Fühlerglied 1 kürzer als der Kopf, bisweilen rostbraun, Glied 2 allmälig verdickt, dicht schwarz behaart, um $\frac{1}{8}$ länger als Hinterrand des Halsschildes. Halsschild fast glatt, fein